

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA GEOGRAFIA DE LOS SUELOS DE COLOMBIA

COMISARIA DEL VICHADA (Orinoquia)

TRIANGULO: CASUARITO - PUERTO CARREÑO- SAN RAFAEL DE MURILLO

Por: JOAQUIN ALVAREZ LIEVANO
HERNANDO SUAREZ FAJARDO
Agrólogos

*Artículo del Boletín de la
Sociedad Geográfica de Colombia
Números 85-86, Volumen XXIII
Primer y Segundo Trimestre de 1965*

FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA
"Jorge Tadeo Lozano"


FACULTAD DE RECURSOS NATURALES
Departamento de Agrología

BOGOTA. D. E. 1965

El presente estudio tuvo como fuente de inspiración las palabras preliminares del Presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia. Ing. Gabriel Sanin Villa, en su discurso de posesión por medio del cual se invita a nuestros compatriotas a redescubrir a Colombia.

Los autores dedican el presente estudio a la Sociedad Geográfica de Colombia y es una contribución de la Universidad de Bogotá "Jorge Tadeo Lozano" al primer Congreso de Territorios Nacionales que se celebrará en Mayo de 1966 en la capital de Colombia.

Bogotá, Diciembre de 1965

 En el presente estudio se examinan las diversas operaciones que pueden ayudar al desarrollo de la zona integrada por Puerto Carreño, Casuarito y San Rafael de Murillo de la Comisaría del Vichada.

El informe es, en general de carácter técnico, no olvidando ciertos factores humanos que nos ayudarán a comprender mejor la solución de los problemas de esta zona.

Toda la información consignada en el presente informe, ha sido cuidadosamente desarrollada y experimentada, y lo único que se propone es facilitar algunas normas para que el hombre que habita estas zonas, logre utilizar sus Recursos Naturales en forma inteligente para que estos les rindan los mejores beneficios.

Al manifestar esta modesta Inquietud, sobre estos territorios que reclaman su correspondiente desarrollo social, esperamos que las personas y entidades más relacionadas con los objetivos que hemos tratado de conseguir, busquen nuevas fórmulas que persigan los mismos efectos pero, ojalá, con posibilidades mejores que las que se han propuesto en el presente trabajo.

Queremos dejar grata constancia por la cooperación prestada para la realización del presente estudio a las siguientes personas: al Sr. Profesor Dr. Joaquín Molano Campuzano, ilustre miembro de la Fundación Universidad de Bogotá "Jorge Tadeo Lozano", quien tuvo a bien elegirnos para esta misión, nos ayudó a vencer muchas dificultades y nos proporcionó su inapreciable concurso durante la preparación del presente estudio: al profesor doctor Jorge J. Vives Abello y al doctor Alvaro Mondragón Gutiérrez, del Laboratorio Químico Nacional, que contribuyeron con los análisis de los suelos y agua: a la Sociedad Geográfica de Colombia y a la División de Territorios Nacionales del

Ministerio de Gobierno, al señor Alonso Caicedo Ruíz, Comisario Especial del Vichada y a todas las personas que en una u otra forma nos prestaron su valiosa ayuda y cooperación.

CAPITULO I

GENERALIDADES

Comisaría Especial del Vichada.- Tiene una extensión de 102.990 kilómetros cuadrados y una población calculada para 1959 de 14.830 habitantes, lo que arroja una densidad de 0.149 habitantes por kilómetro cuadrado con un crecimiento geométrico anual de 23.99%. Según datos obtenidos en el mismo territorio en el presente año, la población total de la Comisaría asciende a unos 40.000 habitantes discriminados así: 10.000 civilizados y 30.000 indígenas integrados por las tribus guajíbas, sálivas, sícuanes, piapocos, amorunas y cuíbas. El resultado del censo realizado en el país el año pasado (1964), asigna como datos definitivos para la Comisaría 10.130 habitantes, de los cuales 1.449 corresponden a su capital Puerto Carreño.

Sus límites son: por el Norte con la República de Venezuela a través del Río Meta -Estado Táchira-; por el Sur con la nueva Comisaría del Guainía; por el Oriente nuevamente con la República de Venezuela, por medio del Río Orinoco -Territorio Federal Amazonas-: y por el Occidente con el Departamento del Meta.

La Comisaría tiene un perímetro total de 1512 kilómetros distribuidos así:

Departamento de Boyacá	198 kilómetros
Departamento del Meta	246 kilómetros
República de Venezuela.. . . .	510 kilómetros
Intendencia de Arauca	42 kilómetros
Comisaría del Guanía	516 kilómetros

Existen en su territorio las siguientes regiones naturales:

- a) La región selvática, que es una continuación de las selvas del Vaupés, tiene la menor extensión con relación a las otras y está localizada a lo largo del río Vaupés y las cabeceras colombianas de la Orinoquia, abarcando sus correspondientes afluencias.
- b) Región de transición, que encierra la afluencia derecha del río Vichada.
- c) La región de la llanura propiamente dicha, con bosque de galería y sabanas naturales que ocupa la mayor extensión, aproximadamente las tres cuartas partes del área total de la Comisaría.

División Política.- Administrativamente se encuentra dividida la Comisaría en los siguientes corregimientos e inspecciones de Policía:

- 1º. Corregimiento de Puerto Carreño
- 2º. Corregimiento de Casuarito
- 3º. Corregimiento de Nueva Antioquia
- 4º. Corregimiento de Puerto Nariño
- 5º. Corregimiento de Amanabén
- 6º. Corregimiento de San José de acune
- 7º. Corregimiento de Puerto Murillo
- 8º. Inspección de Policía de Avispas
- 9º. Inspección de Policía de Santa Rila
- 10º. Inspección de Policía de Cumaribo.

El presente estudio exploratorio de suelos comprende los territorios de los corregimientos de Puerto Carreño y Casuarito, y el caserío denominado "San Rafael de Murillo". Además se consignan datos relativos a la zona marginal del Río Meta por ser esta la que ofrece mejores ventajas para su colonización.

1) Corregimiento de Puerto Carreño.- Es la capital de la Comisaría y tiene una población de 1.040 habitantes civilizados y con frecuencia el corregimiento es invadido por indios guajibos nómadas, incursiones que hacen especialmente cuando se presenta la cosecha de mangos.

En su jurisdicción se encuentran ubicadas dos capitanías, una de ellas en el sitio denominado "El Morichal del Avión", a unos 230 kilómetros de Carreño sobre la carretera que va a Villavicencio; la segunda cerca de la anterior en el lugar denominado "Carro Quemado" y a una distancia de 250 kilómetros de Carreño sobre el mismo carretable.

Límites. - La capital limita por el Norte con el Río Meta; por el Sur con el Río Bitá; por el Oriente por el Río Orinoco y por el Occidente con el Caño Juriépe.

Población.- El último censo registró 1.040 habitantes civilizados que se ocupan en las siguientes actividades:

el 10% en el comercio

- el 15% son empleados y obreros
- el 20% en oficios domésticos
- el 20% en la agricultura, ganadería y pesca
- el 35% lo constituye la población infantil.

Educación.- El Corregimiento cuenta con un plantel educativo de orden mixto que da educación primaria a 380 alumnos 25 de los cuales son indígenas. Actualmente se está construyendo un cómodo y amplio edificio para establecer un internado de bachillerato para aproximadamente 250 alumnos y se prevé la afluencia de estudiantes venezolanos, especialmente de Puerto Ayacucho, Caicara, Puerto Páez. etc. poblaciones en donde se tiene un magnífico concepto de la educación que se imparte en el país.

Servicios Públicos- La capital se abastece de agua proveniente del Río Orinoco gracias a una motobomba y acueducto deficiente en sus servicios por el crecimiento de población que ha tenido últimamente. En igual forma cuenta con una planta eléctrica que genera 60 kilowatios los cuales son insuficientes para el alumbrado y demás necesidades de la población. Además se dispone de un hospital medianamente cómodo, asistido por dos médicos y tres enfermeras, cuya capacidad es de 15 camas con posibilidades de ampliarse.

Mercados y Comercio.- No solamente Puerto Carreño sino las fundaciones cercanas a la capital se abastecen de productos venezolanos como lo son las importaciones de enlatados, ciclas, motores fuera de borda, radios, máquinas de escribir, neveras, loza, etc .. y víveres como arroz, pastas, harinas, leche condensada y otros productos. Se realizan estas operaciones comerciales cuando el cambio de la moneda es favorable, es decir, cuando el bolívar no sube de tres pesos colombianos. En su defecto, todos estos productos se adquieren de Villavicencio y Bogotá. Los materiales para la construcción como son el ladrillo, el cemento, el alambre, etc. se llevan desde Bogotá por resultar más baratos y de mejor calidad. Actualmente se está adaptando un horno para cocer ladrillo, que junto con la fábrica de bloques de cemento existente, constituirá una industria muy importante y próspera.

Corregimiento de Casuarito.- Este corregimiento dista de Puerto Carreño 77 kilómetros y se encuentra en la margen izquierda del Río Orinoco al frente de Puerto Ayacucho Capital del Territorio Federal Amazonas - Venezuela-.

Tiene aproximadamente 100 habitantes que viven exclusivamente del comercio con Venezuela el cual consiste en la venta de telas, cigarrillos, artículos de cuero, etc.

Casuarito está situado sobre una formación rocosa de pegmatita, cuya dureza impide la construcción de calles, alcantarillado, acueducto, etc,. El hecho de que esté situado en este lugar, se debe a la facilidad que hay para realizar el intercambio comercial con Puerto Ayacucho ya que de ésta depende su progreso. Para el futuro será necesario trasladar el corregimiento un kilómetro hacia la llanura donde las condiciones topográficas y geológicas permiten la fácil instalación de los diferentes servicios públicos.

El corregimiento cuenta además, con una pista de aterrizaje que está mal ubicada no permitiendo aterrizajes seguros, sitios más adecuados están a escasos tres kilómetros de la población.

No se sabe exactamente cuál es la población indígena de la jurisdicción pero debe ser muy numerosa y viven en condiciones de completo abandono.

Los únicos servicios del corregimiento se limitan a los que pueden proporcionar una escuela y una planta eléctrica de 12 kilowatios.

3) *Caserío "San Rafael de Murillo"*. _ Es un pequeño caserío situado sobre la margen derecha del Río Meta que tuvo gran actividad agropecuaria cuando fue habitado por colonos venezolanos hace ya varios lustros. En la actualidad es solamente un pequeño poblado que empieza a ser nuevamente colonizado.

GENERALIDADES DE LA ZONA ESTUDIADA

Localización.- La zona estudiada está delimitada en el mapa que se adjunta al presente trabajo y comprende el triángulo que forman Puerto Carreño, Casuarito y San Rafael de Murillo. Es necesario advertir, que, los mapas logrados por las instituciones especializadas en estas materias, están completamente errados y adolecen de muchas fallas. Gracias a la colaboración de la Misión de Santa Teresita, pudimos lograr un mapa, que llevado a escala, nos presenta los rasgos fundamentales, especialmente 'los relacionados con la hidrografía, caminos carreteables y las fundaciones más importantes de la Comisaría.

Puerto Carreño es la capital de la Comisaría y se halla separada del distrito de Puerto Páez por el Río Meta. Tiene una temperatura promedio de 309C., una altura sobre el nivel del mar de 95

metros, dista aproximadamente de Bogotá 1.000 kilómetros y de Villavicencio 880 kilómetros por carreteras. Las coordenadas correspondientes son:

6° 11' 00" de Lat. N y
6° 29' 00" de Long. E de Bogotá.

Casuarito está situado en la margen izquierda del Río Orinoco y frente a Puerto Ayacucho, Capital del Estado Federal Amazonas - Venezuela-. Sus coordenadas son:

5° 39' 00" de Lat, N y
6° 28' 00 de Long. E de Bogotá

San Rafael de Murillo es la más importante fundación de la región situada sobre la margen derecha del Río Meta. Las coordenadas correspondientes son:

6° 11' 00" de Lat. N y
6° 16' 00" de Long. E de Bogotá.

Vías de Comunicación.-

Terrestres.- Puerto Carreño se comunica con el interior del país por medio del carreteable que va de Puerto López a Villavicencio entre los ríos Meta y Bitá. Este carreteable solo está en servicio durante la época de verano, que está comprendido entre los meses de diciembre a mediados de abril. La principal interrupción que tiene el carreteable en el invierno es el bajo de "La Culebra" que tiene una longitud aproximada de 27 kilómetros. Según los colonos, este bajo podría evitarse si se desviara la carretera hacia el Este del caño Muko. En el mencionado caño, sería necesario la construcción de un puente, lo cual permitiría que el carreteable quedara más próximo a la margen derecha del Río Meta. De otra manera y para habilitar el carreteable en el invierno sería necesario el relleno a lo largo de los 27 kilómetros del bajo de "La Culebra", obra que probablemente resultaría más costosa.

Fluviales.- Puerto Carreño se comunica con Puerto López y Fundaciones intermedias, situadas sobre el Río Meta, por navegación que es regular y continua durante el invierno, o sea, desde mediados de abril hasta los primeros días de diciembre, en la época de verano solo es posible y con bastante dificultad la navegación con lanchas y "curiaras".




Foto N° 1 - Se aprecia el Río Orinoco en el sitio del Corregimiento de Casuarito. Al fondo y a su margen derecha se encuentra Puerto Ayacucho capital del Estado Federal Amazonas.

Foto N° 2 - Indios nómadas de la tribu Guahibos recolectando mangos los cuales en tiempo de cosecha se pierden. Esta fruta puede llegar a ser fuente de una importante industria de jugos, enlatados, etc.



Foto N° 3 - Hay tribus que no conocen la canoa o "curiara". Se transportan por los ríos gracias a balsas hechas de palos y bejucos como se alcanza a observar en la presente gráfica tomada en el río Bitá, en zona habitada por indios cuibas.

Puerto Carreño se comunica por el Sur con corregimientos como Casuarito, Puerto Nariño, Amanabén y Santa Rita, por medio de los ríos Orinoco, Vichada y Tomo, así:

A Casuarito la navegación es continua y sin interrupción en toda época del año y se hace por intermedio del Río Orinoco:

En Amanabén y Puerto Nariño es necesario salvar los raudales de Atures y Rabi Pelado por intermedio de una carretera pavimentada que de Puerto Ayacucho va a Sanariapo, toda ella construida sobre territorio venezolano, circunstancia que, por razones obvias, implica una serie de dificultades de orden fronterizo.

Con Santa Rita se comunica por medio de los ríos Orinoco y Vichada, salvando el mismo obstáculo que presentan los raudales, gracias a la misma carretera;

Por vía Orinoco-Tomo es posible la comunicación con Cumaribo. Santa Teresita. Guacamayas y demás fundaciones, hasta empatar con la carretera central que de Santa Rosa conduce a Villavicencio. Actualmente es un camino carreteable abierto en verano.

Puerto Carreño se comunica con el interior de Venezuela, especialmente con la importante Ciudad Bolívar, gracias al Río Orinoco, cuya distancia se cubre en treinta horas de navegación.

Cabe observar que el Río Bitá, que entrega sus aguas a un kilómetro de Puerto Carreño, es navegable durante el invierno, pero actualmente no se utiliza por cuanto no existe ninguna fundación sobre sus riberas. Sin embargo, a lo largo de sus márgenes se encuentran algunas tribus que, según los colonos, son hostiles y asaltan las embarcaciones que eventualmente por ahí transitan en busca principalmente de la sal.

Servicio Aéreo.-- La Comisaría en general y especialmente Puerto Carreño, se comunica con el interior del país gracias al patriótico y eficiente servicio que actualmente presta la empresa aérea "SATENA". A las diferentes zonas hay vuelos regulares que próximamente serán incrementados; este anhelo se debe a que los actuales son insuficientes por el continuo y progresivo auge que están tomando estas zonas nacionales.

Radiocomunicaciones.- Existe el servicio de Marconi prestado por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Además, el Ministerio de Gobierno se comunica directamente con las autoridades de la Comisaría por Radiofonía. Este servicio es prestado directamente desde el citado Ministerio. Varios corregimientos y puestos militares tienen este mismo medio de comunicación.

CAPITULO II

FISIOGRAFIA

La característica fisiográfica más importante es la formada por la llanura propiamente dicha y se encuentra constituida por terrazas altas, medias, bajas, vegones y vegas cuyo origen es aluvial.

Las variaciones que existen entre estas unidades son muy tenues, especialmente en lo que respecta a las terrazas altas, media y baja; a diferencia de lo que ocurre en el centro de los Llanos Orientales, en donde son más marcadas y por lo tanto más fácilmente notadas.

Algunas de las características de estas unidades fisiográficas son las siguientes:

Terraza Alta.- Indiscutiblemente es la más estéril y está cubierta de sabanas naturales con especies de gramíneas como:

"Pasto cadillo" : *Dichromena ciliata* Vahl

"Pasto espiga" : *Leptocorypheum lanatum* (H.B.K.) Nees, o "Pasto Saeta":

"Pasto paja" : *Bulbostylis junciformis* (HB.K.) Kunth.

"Pasto virola" : *Cyperus* sp.

Estas especies son por lo general de mala calidad para el leven y engorde de los ganados.

Terraza Media._ Se puede decir para la terraza mecha lo mismo que se dijo para la unidad anterior, pues los cambios presentados son muy imperceptibles. En esta unidad suele iniciarse el nacimiento de los caños: las gramíneas propias de esta unidad, además de las ya nombradas, son:

"Pasto carrizo" : material estéril indeterminable

"Pasto grasa" : estéril.

La vegetación arbórea exclusivamente tomada por chaparros en cuyo sombrío crecen varias especies arbustivas, la mayoría de ellas espinosas, son una manifestación del microclima originado por el sombrío de aquellos. Si no fuera por las quemadas constantes a que se ha visto sometida la llanura bien distinta sería su ecología, las quemadas han alterado completamente todos los factores que constituyen el hábitat.

La textura de los suelos de esta terraza varía ligeramente de arenoso grueso, propio de la terraza alta, a arenoso fino.

Terraza Baja Es la tercera unidad fisiográfica que se presenta en la zona y ofrece dos aspectos importantes:

a) Una mayor densidad y suculencia de los pastos naturales representados por algunas de las especies ya nombradas para las unidades anteriores y las propias de ésta:

"Pasto alpara" :sin clasificar

"Pasto negro" :sin clasificar

"Pasto moño" : sin clasificar

"Pasto gustoso" : Axonopus purpusi (Mez) Chase

Algunos arbustos, entre ellos.

"El Acato" : Flacourtiaceae,

"Cafeto" : Connarus sp ..

"Mirtillo" : Flacourtiaceae, etc ..

empiezan a manifestarse en la terraza baja.

b) No muy frecuente es la presencia de una costra superficial de material ferruginoso en forma de perdigones formado por disolución, que se ha consolidado alrededor de un núcleo de arena o polen.

Los suelos son similares a la unidad anterior con un mayor contenido de limo.

Vegón.- Se encuentra bien definida por su vegetación, textura y estructura de sus suelos, tiene una fertilidad potencial mucho más apta para la agricultura y ganadería que las unidades ya nombradas. En las avenidas normales de los ríos no suele inundarse, pero es susceptible de éstas en las crecientes anormales que se presentan con una regularidad de cada siete años. Aquí se desarrolla el soto-bosque más corpulento con tejido de bejucos y enredaderas. Igualmente sus pastos son diferentes ya que son de mejor calidad para los ganados y tienen mayor porte.

La textura de los suelos de esta unidad oscila entre franco limoso y franco arenoso y en su perfil se nota la sedimentación horizontal originada por las inundaciones de los ríos lo que nos indica que esta unidad estuvo sumergida por las aguas de los ríos hace relativamente poco tiempo. Las mismas terrazas indican los distintos períodos de desarrollo del cauce de los ríos.

Esta unidad se extiende y va paralela a lo largo de los ríos y caños en estrecha faja.

Vega. -Es la última unidad fisiográfica cuyo nivel está ligeramente por encima del de los caños y ríos y consecuentemente inundable en cualquier tipo de creciente.

Su vegetación, por estar sometida a frecuentes inundaciones, se limita a malezas y algunos arbustos. El principal pasto es el gramalote", alimento preferido de los chigüiros. La textura de estos suelos es franco limo so con una profundidad efectiva mayor de 1.50 mts.

CAPITULO III

CLIMA

El clima es uno de los factores más importantes en el campo de la agricultura, ya que nos da una serie valiosísima de datos que nos permiten deducir y comprender aspectos de vital importancia para poder acortar en la planificación de las tierras.

En este informe nos vemos privados de consignar datos con toda la precisión que demandan esta clase de trabajos, debido a que en la región estudiada no existe alguna estación meteorológica que arroje los datos pluviométricos, distribución de la luz, etc. tan necesarios para poder calcular las necesidades de los diferentes cultivos, de acuerdo al programa de desarrollo que se pretenda.

No obstante, gracias a datos recogidos en la ciudad del Puerto Ayacucho y a las informaciones dadas por los habitantes de la región se han podido deducir varias apreciaciones que muy probablemente están cerca de la realidad.

Precipitación.- Existen dos épocas bien definidas en la distribución, de la precipitación:

- a) La época de lluvia que empieza a mediados de abril y se prolonga hasta finalizar noviembre, y
- b) La época de verano que empieza en diciembre y termina a mediados de abril. El mes de julio se presenta como de transición entre las dos estaciones.

En la estación meteorológica instalada en Puerto Ayacucho, distante de Puerto Carreño 77 kilómetros y de San Rafael de Murillo 140 kilómetros, se obtuvieron los siguientes datos de precipitación anual:

2.200 mm.

La situación de Casuarito con respecto a Puerto Ayacucho nos permite dar para esta zona igual precipitación a la registrada anteriormente, pues ambas están situadas en uno de los vértices del triángulo estudiado. Los otros dos vértices por estar relativamente próximos a Puerto Ayacucho tienen una precipitación pluvial muy próxima a la de Puerto Ayacucho.

Temperatura.- Hay dos estaciones definidas, la de verano cuya temperatura máxima llega a 43°C y mínima a 32°C y la de invierno con una máxima de 35°C y mínima de 25°C.

No hay cambios bruscos de temperatura, ella oscila suavemente, lo que permite que esta región disfrute de un clima seco y excelente.

Vientos.- Por observaciones directas y continuas realizadas durante el tiempo en que se preparó el presente estudio, se puede decir que los vientos en esta época -diciembre a marzo- vienen del Norte y son precisamente los Alisios. Estas deducciones se pudieron establecer mediante el arreglo de ciertos dispositivos que se encontraron en el aeropuerto y por el desplazamiento y dirección que tomaba el humo proveniente de las quemas, muy abundante en esta época.

Se notó su señalada constancia no presentando grandes cambios en la intensidad, velocidad y dirección.

Sabiendo que la temperatura, las nubes, la cantidad de radiación solar, la geomorfología, los vientos, están íntimamente relacionados con los procesos fisiológicos y metabólicos de las plantas, y que en toda la zona de Carreño. Ventanas, Casuarito, San Rafael y la Pinzonera, la presencia de nubes es completamente nula en y época citada, permitiendo una radiación directa y muy alta que hace deshidratar total o parcialmente la vegetación, nos permite hacer creer que ya evaporación potencial es muy superior a la precipitación anual.

Evapo-transpiración.- Por las razones anteriormente expuestas y otros factores externos, tales como la presión de vapor, humedad relativa, saturación de CO₂ y su grado de equilibrio con el O₂ nos permite concluir con seguridad que la gradiente de transpiración de la Zona en estudio, es extremadamente elevado.

No toda el agua absorbida por las raíces para la actividad metabólica de las plantas es retenida por éstas, sino que a través de sus órganos aéreos, como lo son las hojas, pasa a la atmósfera. Este proceso es la consecuencia de una infinidad de factores tanto internos como externos, siendo los primeros de características anatómicas de la planta y los segundos de carácter físico anteriormente mencionados.

La cantidad de agua absorbida del suelo por un vegetal es muy grande si se compara con aquella que la planta contiene en cualquier momento, y la relación entre esa cantidad absorbida y la retenida por la planta varía según la especie y los factores internos y externos. Cuando dicha relación supera el coeficiente de marchitez la planta muere, esto es, si la velocidad con que las

hojas entregan el agua a la atmósfera es mayor la velocidad con que las raíces la absorben del suelo; las hojas perderán gradualmente su hinchamiento quedando sin consistencia hasta ocasionar su muerte.

En los llanos del Vichada, donde la evaporación es tan intensa en la época de verano especialmente, parecen estar reunidos los factores que provocan la sequedad de los pastos naturales y cultivos, como puede observarse en la fotografía N° 4 ocasionando no pocos trastornos en la economía de los colonos. La deshidratación de los pastizales es una de las razones por las cuales los colonos someten las sabanas a quemas regulares para obtener pasto tierno, digerible y rico en proteína. Este pasto no se seca tan pronto, entre otras cosas, por la poca superficie foliar expuesta a las radiaciones solares. Como sabemos, la hoja es la parte aérea especializada en el proceso fotosintético y su anatomía está formada para tal fin, de manera que sus células ocupan una mayor superficie para absorber la luz y estar en contacto con el CO₂ y el O₂; tal conformación anatómica tan favorable para la elaboración de carbohidratos es completamente desfavorable en el caso de la transpiración, permitiendo al máximo la evapotranspiración.

Otro de los hechos importantes que nos induce a confirmar el elevado gradiente de la evapotranspiración de esta zona, es la baja concentración de material disuelto; pues dado el carácter de los suelos, muy pobres en el complejo coloidal, lógico es suponer que tal situación debe imperar. La baja saturación de material disuelto favorece la velocidad de la transpiración: sin embargo, las pocas sustancias disueltas irán concentrándose en el protoplasma para colaborar con la aceleración de la sequedad de la planta.



Foto N° 4 - Como puede observarse, el intenso verano ocasiona la muerte de las plantas. A escasos metros se encuentra la laguna "Tres Matas", cuyas aguas se podrían utilizar en la época de verano con un buen sistema de regadío evitar estas calamidades.



Foto N° 5 - En contraste con la fotografía anterior se aprecian cultivos de "popocheras" en óptimas condiciones.

Foto N° 6 - En el sitio de "Tanumana", ahora el arrecife blando como se alcanza a apreciar. No obstante los pastos naturales florecen.



Sería muy interesante investigar si la concentración de estas sustancias es uno de los principales impedimentos para que el ganado no apetezca los pastos en dichas condiciones, es el caso de las hojas del chaparro, que tienen tal concentración de sustancias que le dan una aspereza semejante al papel de lija por lo que se usan para limpiar, la losa. Este mismo hecho podría estar influyendo en el desgaste acelerado de la dentadura de los ganados.

Para futuros planes de irrigación, este fenómeno de la evapo-transpiración jugará un papel de vital importancia para sus cálculos, por las consecuencias que podría acarrear si no se tuviesen en cuenta.

CAPITULO IV

GEOLOGIA

Debido a que en nuestro país los conocimientos sobre la geología y la geomorfología, útiles para el campo agrológico, son sumamente limitados, puesto que solo contamos con mapas geológicos generales de escalas que varían de 1:200.000 al: 1.000.000, nos ha sido muy difícil la descripción geológica de esta zona. Por las razones anteriores no estamos en capacidad de hacer una descripción geológica precisa, máxime cuando esta región no está representada en las planchas geológicas del país.

Sin embargo, basados en el sistema de drenajes que allí predomina, podemos anotar que esta zona corresponde a una orognosia que al guardar uniformidad completa impone la disyuntiva de creer que la geología en que se fundamenta es también rigurosamente uniforme. Sobre esta geología homogénea se han depositado los sedimentos más finos procedentes de la Cordillera Oriental que han sido llevados allí por el arrastre de los ríos.

La erosión de la cordillera ha sido consecuencia de la solevantación del terciario y del cuaternario. Este proceso erosivo del terciario ha formado los depósitos pleistocénicos de los llanos que se hallan constituidos por materiales más finos o pesados según sea la distancia a que se encuentren de la cordillera. El hecho de que los suelos de la zona en estudio aparezcan con una textura generalmente arenosa se debe a que el material fino arrastrado desde la cordillera, ha sido lixiviado y se encuentra en las capas inferiores.

Las corrientes de agua denominadas caños tienen su origen en la misma llanura, pero se hallan más distanciados que en el centro de los llanos.

Las terrazas mencionadas en el capítulo de fisiografía están constituidas por una base de gravilla fina y arena y su pendiente es completamente plana y muy uniforme, de 0 a 1 %. La fertilidad de los suelos está en función del nivel de las terrazas, siendo menos fértiles de las más altas. Haciendo la analogía con el drenaje, tendremos, que serán mejor drenadas las terrazas altas que las bajas.

Uno de los aspectos más interesantes que presenta la geología de esta zona es la formación de arrecife. Es propio de las regiones tropicales con estaciones secas y húmedas definidas, como las que presenta Puerto Carreño, Casuarito, San Rafael, la Pinzonera. Este arrecife, que es de aspecto

concrecionario y se manifiesta en grandes depósitos. tiene su génesis en el siguiente proceso químico:

- a) durante la estación seca la humedad del suelo se concentra y asciende a la superficie para ser evaporada;
- b) después de la evaporación se presenta la consabida precipitación de los materiales que contenía la solución, los cuales quedan en la superficie; y
- c) La reacción química que se presenta generalmente es de orden irreversible lo cual permitirá que la acumulación de este material concrecionarlo forme el arrecife.

En un estudio sobre los llanos venezolanos ejecutado por Augusto Bonazzi para conocer el origen de los distintos suelos rojos que hay en la llanura, llegó a la conclusión de que "muchos de ellos descansan sobre horizontes ferruginosos consolidados conocidos en la región bajo la denominación de "arrecife", Bonazzi constató además que "en otras localidades en donde prevalece una alternación de estaciones fuertemente lluviosas con estaciones extremadamente secas, esta estructura parece estar en curso de formación".

En la zona de estudio, como ya se anotó: se encontró esta misma formación que en ocasiones emerge. En algunas calicatas se halló a una profundidad de 1. 2, y 2.50 metros, como lo enseña el perfil No. 12 que corresponde al sitio denominado "La Cabaña", y el No. 18 cerca de Casuarito en el sitio de "Tanumana".

Se puede anticipar que este mismo arrecife se encontró en las sabanas de los ríos Tomo y Tuparro y que Bonazzi lo define como una masa vesicular concrecionaria del pleistoceno". Las condiciones climatológicas halladas por el mismo autor en los alrededores de calabozo son muy similares a las encontradas en Puerto Carreño, Casuarito, San Rafael, o sea, épocas definidas de intensa lluvia y de extrema sequedad. Según el mismo estudio, estos conglomerados "están formados por fragmentos silíceos redondeados por efecto del transporte acuoso, unidos entre sí por un cemento de óxido de hierro que acusa haber sido depositado en sucesivas capas sobre la superficie de la mencionada grava", y agrega que esta es "una concreción ferruginosa que puede tener varios orígenes entre los cuales los más frecuentes son:

- a) rubefacción del suelo con lixiviación superficial.
- b) la ferretización "in situ" en perfiles hidromorfos, que conduce a neoformaciones concrecionarias en la masa del perfil,
- c) las alteraciones lateríticas sub-aéreas en su sentido más restringido".

El autor sigue haciendo algunas apreciaciones científicas en busca de otras posibilidades, y agrega "por las Observaciones y análisis hechos del arrecife de Calabozo que comprueba la presencia de abundantes esporas, granos de polen, fragmentos de residuos foliares, toldos órganos aéreos de las plantas, en el interior de la masa ferruginosa, sin tener en cuenta los numerosos fragmentos radicales, indica que el "arrecife" de Calabozo se formó bajo condiciones en las cuales la acreción ferruginosa pudo atrapar y aprisionar estos fragmentos vegetales aéreos, porque ella se efectuó en forma continua sobre una superficie expuesta a recibir estos residuos. La ulterior consolidación se efectuó por la depositación de capas sucesivas de acreción por sobre las acreciones anteriores. La naturaleza misma del polen, de los residuos foliares (frondas de criptógomas) y de las abundantes esporas, tiende a Indicar que este arrecife se formó bajo condiciones subacuicas, cenagosas, en las cuales, probablemente, actuó la flora bacteriana del ciclo del hierro".

En este orden de ideas el autor, Dr. Bonazzi, llega a la conclusión de "que el arrecife no es una laterita sensu strictu, sino una sucesión de capas cementadas, más o menos espesas, y que cada una de ellas, formada en la superficie de las anteriores por la precipitación del hierro disuelto en las aguas ácidas cenagosas, merced a la acción bioquímica, fácilmente llegó a aprisionar, esporas y tejidos aéreos vegetales caídos de las plantas a las aguas durante el proceso de la depositación del hierro". Y agrega que por "Impregnación con el óxido de hierro recién precipitado, este tejido vegetal entra a formar parte integral del arrecife que se está formando en el Fondo de la ciénaga. "Numerosos granos de polen y fragmentos de tejido le permitieron asegurar que estaban impregnados todavía de hierro, aún después del tratamiento adoptado para aislarlos". Y que. "los pedregones negros o azul oscuro que se encuentran en abundancia en los suelos inundados del llano, tienden a prestar apoyo a la hipótesis como también la apoya la presencia de pequeñas cantidades de fósforo (P_2O_5 .) que se encuentra irregularmente distribuidas en este arrecife: fósforo derivado muy probablemente del contenido celular de bacterias, hongos, polen y residuos foliares ocluidos.

Otras formaciones de este arrecife son Fe_2O_3 óxido férrico; Al_2O_3 , óxido de aluminio; SiO_2 , sílice; CaO , óxido de calcio y K_2O óxido de potasio." Por último el autor dice, terminando su interesante estudio, que los "futuros estudios estadísticos aclararán cuales fueron el clima y la ecología durante la formación "arrecife".

Fuera de la formación anteriormente mencionada existe a lo largo del Río Orinoco una formación rocosa de sienita y granito.

CAPITULO V

SUELOS

Hubo necesidad de hacer un reconocimiento muy rápido de la zona, logrando un levantamiento exploratorio de suelos del área enmarcada por el triángulo objeto de estudio. En este trabajo se puso especial atención para delimitar "grosso modo" las zonas que ofrecen las mejores posibilidades y que por especiales cualidades pueden tener un magnífico porvenir. Además, este trabajo, con toda la información recogida, puede ser una guía para la ejecución de estudios más detallados.

Es bueno advertir que al querer llevar a cabo programas agrícolas específicos demanda, por otro lado, la realización de estudios de suelos de orden preliminar y general, poniéndole especial atención a aquellas zonas que por sus cualidades agroeconómicas pueden ser potencialmente productivas.

Este levantamiento exploratorio, como es de suponer, demanda y da pie para formular juicios próximos sobre la potencialidad agrícola de la zona, indudablemente y, según nuestro parecer, estas regiones, jugarán dentro de poco tiempo un papel de vital importancia en la economía del país. Son territorios que van teniendo el mismo proceso evolutivo que tuvieron los llanos del actual departamento del Meta no hace más de 15 a 20 años. Este mismo proceso se cumplirá en el Vichada, pero evidentemente lo hará con más rapidez debido a que las actuales condiciones socio-económicas del país así lo exigen. Además el avance logrado en la tecnología agrícola puede hacer más rápido este proceso.

Basados en la 7ª aproximación, hemos tratado de insinuar las clases de suelos que allí se encontraron, lo cual es aproximado, máxime cuando los suelos tropicales y sub-tropicales son los menos investigados. Es el caso de los Oxisoles que apenas han sido estudiados hasta más o menos la 3ª aproximación.

Por las características de los suelos hallados en su correspondiente exploración, creemos que entre los órdenes existentes que hay en esa zona (Puerto Carreño-Casuarito-San Rafael) se encuentran representados tres de ellos a saber:

- 1) los Ultisoles.
- 2) los Oxisoles y
- 3) los Entisoles.

Exponemos a continuación las características de cada uno de ellos, características que nos han inducido a hacer esa afirmación:

Ultisoles.-Este suelo se halla representado en el perfil N° 4 -Fundación "El Merey"- cuyas características generales son el de poseer tenuemente el horizonte argílico, caracterizado por la remoción de la arcilla de horizontes superiores a inferiores mediante el proceso llamado de iluviación; poseer, además un epipedón úmbrico caracterizado por su color oscuro, debido muy posiblemente al carbono orgánico. En estos suelos no se ven indicios de minerales meteorizables en las fracciones limo y arcilla. En relación a la saturación de bases no fue posible obtener los datos de laboratorio, necesarios para poder confirmar más este orden. Este suelo, en general, se encuentra en las terrazas bajas más distantes de los ríos.

Oxisoles.- Este orden incluye a los suelos denominados como Latosoles de las clasificaciones recientes pero anteriores a la 7ª aproximación. Parecen ser los más abundantes de la región y se caracterizan por poseer un epipedón ócrico, esto es, colores claros, contenido de materia orgánica demasiado bajo que incluye al horizonte superficial. El horizonte argílico, que es una de las características de los Oxisoles, no se encuentra representado pero en cambio es abundante la plintita endurecida en la superficie y blanda cuando se encuentra a mayores profundidades.

Trataremos de hacer referencia de algunas teorías expuestas por varios autores, respecto de estos suelos cuyas referencias nos servirán para hacer comparaciones muy importantes.

"H. Harrasowitz ha dado la descripción de un perfil de laterita típico y presenta algunas de las características principales de este grupo de suelos. Según este autor de perfil consta de cuatro horizontes:

Roca madre, a la que sucede un horizonte que representa el material de meteorización primaria de carácter caolinítico, seguido un tercer horizonte laterítico que pasa a un horizonte superficial caracterizado por incrustaciones y concreciones ferruginosas. La zona de descomposición puede ser una mera película o puede alcanzar un espesor de un metro o más. La costra ferruginosa superficial puede alcanzar tal desarrollo, que puede evitar el crecimiento de la vegetación".

La costra ferruginosa a que hace, referencia este autor se hace manifiesta en muchos sitios y se presenta con lujo de detalles en el sitio de "Tenumana".

"G. C. Stephens estudiando la edafogénesis en la formación de lateritas considera que las lateritas han tenido su desarrollo en los tiempos terciarios". Ver el capítulo de geología del presente trabajo.

Otros autores como "Hardy y R. R. Follett-Smith, describiendo un perfil en la Guayana Británica, encontraron cuatro horizontes así:

- 1) Laterita y fiderita superficial frecuentemente vesicular que se disgrega en bloques en la superficie.
- 2) Suelo superficial. Arcilla húmica pardo rojiza; 20 cms.
- 3) Tierra roja leonada, friable y con grava especialmente en la parte superior. La grava está formada por piezas de laterita, lentejones de fiderita y fragmentos de cuarzo; espesor de 3 a 6 metros. Y
- 4) Laterita roja primaria dura y costrosa; espesor 7 cms ., sobre una superficie de roca rota".

La serie de descripciones que hacen los anteriores autores y consignadas en el libro de suelos de Robinson, corresponden al trópico y reúnen en general las mismas características de orden climatológico y muy posiblemente geomorfológico de la Orinoquia Colombiana.

La descripción de Hardy, por ejemplo, está localizada aproximadamente a 800 kilómetros de Puerto Carreño; los estudios de Bonazzi en las llanuras de Calabozo están a solo 300 kilómetros de la misma ciudad; los yacimientos de hierro en explotación, más ricos en la cuenca hidrográfica del Orinoco -sitio del Imataca-, están situados a 650 kilómetros de Carreño; y también los yacimientos de San Felipe, que se encuentran a solo 450 kilómetros de Carreño, nos permiten hacer una serie de interrogantes que nos pueden hacer creer que los llanos del Orinoco, pueden contener incalculables depósitos de este mineral (hierro), toda vez que las mismas características se hallaron en el consabido triángulo: pues, está bien comprobado que esta zona pertenece a la misma cuenca hidrográfica del Imataca y los llanos de Calabozo son una continuación de la llanura colombiana. Lo anotado para el hierro, puede, también ajustarse para los diamantes industriales que explota Venezuela.

Ahora bien, los perfiles que describieron Hardy y Follet-Smith son muy parecidos a los descritos a lo largo de Casuarito, Puerto Carreño, San Rafael. La Pinzonera, los cuales se incluyen en el presente informe. Además, las concreciones ferrolíticas de que habla Hardy,-Follet-Smith y Bonazzi, es lo singular de toda esta zona.





Foto N° 7 - Se aprecia la rotura de esta roca ferrolítica originada por un desequilibrio de presiones. Margen izquierda del Río Orinoco en Puerto Carreño,

Foto N° 8 - Vista panorámica de la laguna de "Tres Matas", cuyo gran caudal impide que no se seque ni en los veranos más rigurosos. Otro tanto sucede con los numerosos caños, cuyo caudal permanece regularizado en contraste con los Llanos Orientales del Meta, Casanare y Arauca.



Entisoles.- El horizonte plageno que es tan representativo en este orden no fue hallado, pero en cambio, sí se encontró el horizonte álbico que es aquel del cual se han lixiviado la arcilla y los óxidos de hierro libres, quedando representado principalmente por partículas de arena y limo primarios. La anterior característica se halla muy bien definida en estos suelos. Este horizonte, el álbico, se encuentra en la superficie principalmente sobre un suelo mineral. Además, es posible que la acción del viento haya influido en este horizonte, detalle este que es muy propio de los Entisoles.

En estos suelos se presenta en la época de invierno, (abril, noviembre), un lavado por aguas de infiltración que origina un empobrecimiento en las bases y acidifica más el perfil, lo cual, trae como consecuencia la inestabilidad para el complejo arcilla. No ocurre lo mismo en la época de verano, pues debido a la alta temperatura la evaporación es tan intensa que hace que el suelo se seque hasta una gran profundidad.

En la misma forma que se encontró plintita en los Oxisoles de la zona, también en los Oxisoles se encontró pero en menor cantidad.

Otra de las características de este orden de suelos y que se pudo constatar, es el de que el material parental de los sitios representativos, se encontró a gran profundidad.

CAPITULO VI

HIDROGRAFIA

Todos los datos relacionados con la hidrografía de los llanos jugaran un papel de gran importancia, ya que por sus especiales características de orden fisiográfico, geomorfológico, etc., hacen que estas zonas estén sometidas a periódicas inundaciones.

Por carecer de datos sobre aforamientos no es posible relacionar las épocas de los máximos y mínimos caudales de los ríos que atraviesan esta zona.

Para lograr un control mediato en el régimen hidrológico de los ríos provenientes de la Cordillera Oriental y los nacidos en el mismo llano, sería necesario empezar a realizar y extender los estudios al conjunto de tributarios de cada uno de los grandes ríos, pudiendo establecer controles adecuados a las inundaciones y erosión. Estos estudios hidrológicos son muy largos, abarcando aspectos tales como aforamientos, evaporación, cálculos de infiltración, datos pluviómetros, aptitud y calidad de las aguas para el riego, reforestación de las vertientes. etc. no quiere decir en manera alguna, que no se puedan hacer toda esa serie de experimentaciones. Quizá muy pronto los gobiernos y entidades privadas especializadas puedan llevar a cabo estas realizaciones, en gran escala, para beneficio de los llanos del Vichada y en general de los Llanos Orientales.

La zona de este estudio está enmarcada por grandes ríos como lo son el Orinoco y el Meta. Igualmente la atraviesa el bellissimo Río Bitá y numerosos caños de gran caudal Como el Caño' Guaripa, el Caño La Meseta, el Caño Negro, el Caño Umirica y otros. Se encuentran a unos 15 kilómetros de la desembocadura del Río Bitá las lagunas de "Tres Matas" y "Coco de Mono", cuyas características principales son la de contener una inmensa reserva de agua y encerrar gran riqueza ictiológica. Estas lagunas son indicadoras de la profundidad a que está el nivel freático que para la terraza alta, está a unos 8 metros de profundidad, en la época de máxima sequía.

CAPITULO VII

RIEGO

En general los llanos del Vichada, pero especialmente la zona del presente estudio, poseen inmensas cantidades de agua en todo tiempo que son aptas para el riego como lo comprueban los análisis de los ríos Bitá y Orinoco que atraviesa y enmarca el Vichada, respectivamente. Un distrito de riego en esta zona llegará a ser pronto indispensable y su costo sería inferior a lo comúnmente exigido para esta clase de trabajos, dada la topografía completamente plana y la relativa cercanía de los ríos entre sí.

El método más conveniente lo dará un estudio más específico de esta región. Sin embargo, y en función de los análisis físico-químicos con fines agropecuarios, se puede anticipar que un riego por aspersión sería el más conveniente debido a la estructura generalmente franco-arenosa; otro sistema se nos ocurre, podría someter al suelo a un exclusivo lavado de los fertilizantes y bases que de por sí son muy escasos en estos suelos.

A continuación se incluye el resultado del análisis de las aguas del Río Bitá hecho por el laboratorio Químico Nacional:

Turbidez en SiO ₂	7.00 mg/litro
pH potenciométrico a 20°C	7.20
Conductividad específica a 25°C	25 micromhos cm ⁻¹
Dureza total, E.D.T.A. en CaCO ₃	10.44 mg/litro.
Alcalinidad al Metil Naranja en CaCO ₃	15.00 mg/litro.
Alcalinidad a la Fenolftaleína	Negativa
Carbonatos	Negativos
Bicarbonato en HCO ₃	16.30 mg/litro
Cloruros en Cl	Trazas
Sulfuros	Negativos
Sulfatos en SO ₄	0.50 mg/lit.
Nitritos	Negativos
Nitratos en NO ₃	1.00 mg/lit.
Sílice en solución en SiO ₂	13.50 mg/lit.

Hierro total en Fe ..	0.75 mg/lit.
Hierro en solución en Fe ..	0.30 mg/lit.
Calcio en Ca ..	1.93 mg/lit.
Magnesio en Mg ..	1.37 mg/lit.
Amonio ..	Negativo
Sodio en Na ..	0.92 mg/lit.
Potasio ..	Negativo
C02 libre ..	2.00 mg/lit.
Cloruro libre ..	Negativo
Relación de Adsorción de sodio RAS ..	0.12
Clasificación para irrigación ..	Co – S1
Sólidos totales, evaporación a 105°C ..	50.00 mg/lit.
Sólidos en solución, evaporación a 105° ..	40.00 mg/lit.
Sólidos en suspensión (por diferencia) ..	10. 00 mg/lit.

NOTA.- La potabilidad química de esta agua se encuentra demeritada por la turbidez (límite 5 mg/lit., y por el contenido de hierro en suspensión (hierro total menos hierro en solución, límite 0,30 mg/lit.

Estos inconvenientes pueden eliminarse fácilmente mediante filtración cuidadosa.

En cuanto a su dureza, se clasifica como *agua blanda*; para irrigación queda clasificada dentro del grupo Co – S1 de *bajo peligro de salinidad y sodización para los suelos*.

Aconsejamos su control bacteriológico antes de darla al consumo humano.

LABORATORIO QUIMICO NACIONAL
(Fdo.) ALVARO MONDRAGON GUTIERREZ
Químico-Jefe



Foto N° 9 - Al igual que la laguna de Tres Matas, la laguna "Coco de Mono" tiene una gran capacidad para acumular agua y son ricas en caza y pesca.



Foto N° 10 - Río Orinoco en las inmediaciones de Casuarito con sus formaciones geológicas características.

DRENAJE

La zona estudiada en general, dispone de buen drenaje natural; sin embargo, hay fajas pequeñas que durante el invierno se inundan, una vez que estas zonas quieran integrarse a la economía del país, será necesaria la adopción de un sistema de drenes. El más conveniente y económico, dado el bajo valor de las tierras, sería el sistema de drenes por canales abiertos.

Como caso particular podemos consignar la siguiente información: Existe un colono que posee una subsoladora para drenes topo, pero creemos que este sistema es el menos conveniente debido a la textura y estructura de los suelos, lo cual le daría corta vida al sistema. Sería necesario aconsejar a los colonos para que no popularicen este método, pues debido a su bajo costo es fácil su adquisición y no rendiría los beneficios esperados por las razones mencionadas anteriormente.

CAPITULO VIII

ECOLOGIA

La información que debe llevar un estudio de esta naturaleza sobre la vegetación natural y la ecología en general, proporciona una serie de datos que al asociarlos a otros nos hacen llegar a conclusiones de vital importancia para el planeamiento y desarrollo agrícola. Si la vegetación natural no ha sido afectada por la actividad del hombre, que infortunadamente no es el caso de esta zona por las quemadas sucesivas a que ha estado sometida desde tiempos legendarios, nos da una pauta para comprender mejor las condiciones de los suelos, su clima, la humedad relativa, etc.

En resumen se puede decir, que la vegetación natural es el reflejo y verdadera manifestación de las condiciones ambientales que han imperado, y que constituyen un patrón preciso de la potencialidad productiva de los suelos y nos enseña las reglas básicas que se deben aplicar para la obtención de sus máximos rendimientos.

Según el sistema de clasificación de L. R. Holdridge, esta zona, ecológicamente está incluida dentro del bosque seco tropical, el cual se caracteriza por los siguientes factores:

"Temperatura mayor de 24°C.:

promedio de lluvia anual entre 1.000 - 2.000 mm.;

altura sobre el nivel del mar entre 0 y 1.000 mts.

sabanas aptas para la ganadería y con riego complementario para la agricultura".

La información de este capítulo no es completa debido a que la mayoría de los nombres vulgares con que se conocen las diferentes especies vegetales de la zona no han sido encontrados en los catálogos especializados de clasificación botánica. Sin embargo, se mencionarán los nombres vulgares con que se conocen en la zona, así como los nombres científicos hasta donde las circunstancias lo permitan.

Como es de suponerlo, existen más especies, pero únicamente se mencionarán las que nos fueron enseñadas por las personas que habitan esa región.

El clima ha influenciado poderosamente el carácter ecológico de la zona. Las dos épocas climatológicas, seca y húmeda, han imprimido cierta "personalidad" a la región, dando origen a una vegetación de carácter subxerofílico, que se caracteriza por bosque de galería a lo largo de los ríos

y grandes caños; sabanas con pastos naturales, generalmente gramíneas; presentándose en las mismas sabanas pequeños árboles, especialmente el chaparro (*Curatella americana*).

Otro de los factores que han influenciado poderosamente la ecología de esta zona, es la quema constante a que se ha visto sometidos la llanura desde tiempos muy remotos, por los indígenas y actualmente por éstos y los colonos.

Principales especies que forman la ecología de la zona:

Arboles:

Mango (*Mangifera indica* L.).
Marañón o Merey [*Anacardium occidentale* L.]
Bongo (*Canivallesia plantanilolia* H.B.K.).
Congrio (*Aristolochia* spp.)
Alcornoque (-----)
Caramatale o Corazón (.-----)
Chaparro (*Curatella americana*)
Sarsafraz o Asafraz (probablemente *Cuminum cyminum* L.)
Verraco (*Sponia micrantha* Dcne.)
Laurel Comino (*Aniba perullis* Hemsli)
Sarrapia (*Coumarona odorata*)
Gualanday (*Jacaranda* spp.)
Chigo o Guamo (*Inga* sp.)
Chicle (*Achrasapota*)
Acato (*Flacourtiaceae*)
Cafeto (*Connarus* sp.)
Mirlillo (*Flacourtiaceae*)
Saladillo Blanco (- - - - -)
Saladillo Colorado (- - - - - ' - -)
Yopo (*Piptadenia peregrina*)
Guareti (- - - - -)

Palmas:

Palma Araco (-----)
Palma de Moriche (*Mauritia minor* Burret)

- Palma de Moriche Macho (-----)
- Palma Real (Sheelea spp.)
- Palma Macaná (-----)
- Palma de Cuma re (Astrocaryum vulgare Mart.)
- Palma de Cubarro (-----)
- Palma de Seje (Jessenia polycarpa Karst.)
- Palma de Cochi (-----)

Pastos:

- Pasto Cadillo (Dichromena ciliata Vahl)
- Pasto Carrizo (-----)
- Pasto Espiga (Leplocorypheum lanatum _H.B.K._ Nees)
- Pasto Grasa (-----)
- Pasto Gustoso (Axonopus purpusi (Mez) Chase)
- Pasto Paja (Bulbostylis [uncllormis -H.B.K.- Kunth)
- Pasto Virola (Cyperus sp.)
- Pasto Saeta (-----)
- Pasto Betiber (-----)
- Pasto Yunque (-----)



Foto N° 11 - La mayor parte de la Comisaría se caracteriza por tener bosques de galera con maderas de muy buena calidad.



Foto N° 12 - Perfil N° 1 Fundación "El Merey".

CAPITULO IX

FAUNA

Uno de los propósitos primordiales que persiguen los conservacionistas, es el de aprovechar racionalmente los recursos naturales de las naciones.

Por esta razón vemos necesaria la inclusión de un capítulo relacionado con la fauna, queriendo insinuar el establecimiento de normas que conlleven a la conservación e industrialización de las diferentes especies que, como las observadas en la Orinoquia, están condenadas a perecer si persiste el abandono y la indiferencia en este otro campo de la educación. Primero que todo deberá cumplirse la legislación que sobre estas materias existe y crear cuerpos especializados para su incremento y vigilancia.

La fauna de toda esta zona es muy interesante por la variedad y la inmensa riqueza que encierra lo cual le proporciona al paisaje un tono de singular belleza.

La fauna de los quelonios, reptiles, aves, peces y demás especies zoológicas, actualmente representadas, nos dan una mediana idea de lo que ha podido ser el mundo biológica de la Orinoquia no hace muchos lustros.

En los bosques, caños, ríos, sabanas, bajos: etc., existen especies como la de los:

- monos,
- micós,
- tigres,
- tigrillos,
- jaguares,
- pumas,
- dantas,
- zaínos o cafuches, (cerdos salvajes).
- lapa o boruga,
- tinajos,
- chigüires.
- perro de agua o lobón (*Ptenomura brasiliensis*),
- venados,

cachioamos o armadillos,

Más abundante y variada puede ser la riqueza en aves. La cantidad de especies con sus abigarrados y bellísimos colores de su plumaje y las melodías de sus cantos dan a estos sitios semblanza paradisiaca que bien podría explotarse en el ramo del turismo.

Entre otras tenemos la siguiente avifauna:

pajuiles,
pavas (muchas variedades).
patos (muchas variedades),
loros,
guacamayas,
pericos,
patos reales,
gallinetas,
garzas,
garzón,
Pelícanos,
Gabanés,
Gavilanes,
Arrendajos,
Mirlas,
Turpiales,
Gonzalitos,
sangre de toro,
maiceros,
alcarabanes y muchos más.

En el orden de los peces encontramos una incalculable riqueza que bien valdría la pena aprovechada. Los nombres científicos no quedan incluidos por la dificultad para su clasificación, debido entre otras cosas a los nombres vulgares con que se les conoce en la región.

Otro tanto puede decirse para las aves y demás especies de la fauna terrestre.

Principales especies:

DE ESCAMA

morocoto,	peso aproximado-	6	kilogramos,
morocoto piedrero,	" "	0.5	"
cachama,	" "	6.00	"
cachma negra,	" "	12.00	"
	" "	6.00	"
payara,			
coporo,	" "	1.00	"
(bocachico),			
yamú (bocón),	" "	0.5	"
palomera,	" "	10.00	"
pavón,	" "	5.00	"
guabina,	" "	0.5	"
mijo,	" "	0.5	"
caribe burro,	" "	2.0	"
caribe pinche,	" "	0.5	"
caribe colorado,	" "	0.5	"
arenca,	" "	5.0	"
sardina rabo colorado	" "	2.0	"
curvinata,	" "	2.0	"
cuaracuo,	" "	; 0.2	"
cabeza de manteca,	" "	0.5	"
pámpano,	" "	0.5	"
sardinata,	" "	5.0	"
Vieja,	" "	0.2	"
sábalo,	" "	4.0	"
caloche,	" "	1.5	"
cucha,	" "	0.3	"
corrosca o nicure,	" "	0.2	"
sapuhara,	" "	7.0	"

DE CUERO

valentón	-peso aproximado-	200	kilogramos,
burro,			
valentón plumita,	" "	60	"
toruno o bagre amarillo,	" "	60	"
cayara,	" "	36	"
doncella,	" "	5	"
bagre,	" "	6	"
paletón,	" "	5	"
manta,	" "	4	"
mapurito,	peso aproximado-	2	
dorado	" "	40	
curito,	" "	3	
sierra,	" "	25	
manatí o vaca,	" "	220	
marina,			
barbiancho,	" "	4	
bagre tigre,	" "	60	
yaque,	" "	4	
lebranche,	" "	2	
bagre sapo,	" "	2	

Es muy abundante la tonina, un mamífero de gran tamaño, cuya anatomía es parecida a la de la mujer especialmente en los órganos genitales y los senos. Es peligroso navegar en embarcaciones pequeñas con niños que lloren, porque las toninas al creer que son sus hijos las hacen naufragar.

Sistema de Pesca. En general todos los sistemas son empleados pero principalmente se usan los siguientes:

1. el de chinchorro;
2. el de anzuelo;
3. el de arco y flecha (muy usado por los indios).
4. el de barbasco. (practicado por los indios);
5. el de carnada artificial (el menos usado);

6. el de arpón y linterna durante la noche. usado especialmente para la captura de tortugas y galápagos.
7. el de la atarraya;
8. el de carure, que es un artefacto hecho de madera y bejucos, y se coloca en la desembocadura de los caños permitiendo la entrada de los peces, pero no la salida.

Para la pesca con barbasco los indígenas tienen en sus capitanías cultivos especiales.

La pesca con tacos de dinamita fue usada en épocas anteriores.

La pesca por el sistema de chinchorro consiste en una larga red sujeta por dos embarcaciones que avanzan paralelas.

Además, se encuentran la anguililla o temblón, la raya tigrina con un diámetro de 0.25 mts., la raya manta de un diámetro máximo de 0.80 mts. y un peso de 30 kilogramos. Se encuentran caimanes hasta de 7 metros de longitud y babillas o cachirres hasta de 2 metros.

Este caudal de riqueza clama por una legislación conservacionista. Se pudo comprobar la bondad y los frutos de la legislación venezolana que, por su rigidez con que es aplicada, está enriqueciendo y conservando la fauna del hermano país. Allí no se impide la pesca o la caza, sino que estas se hacen y se explotan basándose en los principios conservacionistas.

La legislación colombiana velaría por la conservación, incremento e industrialización de las especies autóctonas. Además, se podría fomentar el cultivo de ciertas especies como la tortuga, lo cual podría ser llevado a la práctica por un cuerpo especializado que realizaría el estudio biológico de las especies para que la iniciativa privada se incorpore a su explotación técnica. Este mismo cuerpo delimitaría los parques, reservas y refugios, etc, y se encargaría de su administración y manejo.

Con todo lo dicho, nadie más autorizado que el Ministerio de Agricultura para que tome las medidas más convenientes; porque hasta el presente ningún Ministro ha comprendido la importancia de la ciencia conservacionista y su significación para Colombia y el mundo.

CAPITULO X
ANALISIS FISICO-QUIMICO DE LOS SUELOS

A continuación se anexan las descripciones de los diferentes perfiles, los análisis químicos de los suelos más representativos realizados por el Laboratorio Químico Nacional, y las recomendaciones de los fertilizantes requeridos para determinados cultivos que se han calculado para el caso.

Estas descripciones, análisis y cálculos, son los datos básicos para proponer normas con destino al uso y conservación del suelo, que permite ejecutar y facilitar la realización de un plan agrícola.

Los perfiles se describieron y se ajustan a las indicaciones establecidas por el "Soil Survey Manual" de la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos de Norteamérica.

Perfil N°1

Fecha: 3 de febrero de 1965

Localización: A 10 Kms, de Puerto Carreño sobre la margen derecha del carretable que va a Puerto López.

Altura: 95 metros sobre el nivel del mar

Describieron: Joaquín Alvarez-Hernando Suárez

	0.0 – 0.20	0.20 – 0.40	0.40 – X
Textura:	Franco arenoso	Arenoso	Franco arenoso
Estructura:	Subangular fina		
Color:	10 YR 4/3 amarillo a Amarillo oscuro	7.5 YR 7/8 amarillo rojizo	5 YR 5/8 rojo amarillento
Consistencia, en seco:	Dura;	Suelta	Dure:
" en húmedo:	Friable;	Muy friable;	Friable;
" en mojado:	No pegajoso y no plástico	No pegajoso y no plástico	No pegajoso y no plástico
Permeabilidad:	Rápida	Muy rápida	Lenta
Retención de humedad:	Mala	Muy mala	Regular
Presencia de raicillas:	Regular	Escasa	No hay
Presencia de macroorganismos:	Regular		
Contenido de materia orgánica:	Bajo	Muy bajo	No hay
Reacción al HCl:	No	No	Muy bajo No

Observaciones:

Drenaje externo muy lento;
 " interno: medio;
 " natural: pobremente drenado
 Pendiente: 0 – 1%
 Relieve: Plano
 Erosión: no hay

Profundidad efectiva 0.30 mts
 Nivel freático: de 7 a metros
 Apreciación Textural: muy liviano

Uso actual: cultivos de plátano, merey, piña
 Uso actual: cultivos de plátano, merey, piña
 Mango, pastos naturales.

Perfil N° 2

Fecha: 3 de febrero de 1965

Localización: A 20 Kms de Puerto Carreño sobre la margen derecha del carretable que conduce a Puerto López

Altura: 96 metros sobre el nivel del mar. –Aprox.

Describieron: Joaquín Álvarez – Hernando Suárez

	0.0 – 0.25	0.25 – 0.35	0.35 – X
Textura:	Franco arenoso	Franco arenoso	Arenoso
Estructura:			
Color:	10 YR 6/1 gris claro	10 YR 6/4 marrón claro	7.5 YR 5/8 marrón oscuro
Consistencia, en seco:	Suelta;	Grisáceo	
" , en húmedo:	Friable;	Suelta;	Ligeramente dura;
" , en mojado:	No pegajoso y no plástico	Friable;	Friable;
Permeabilidad:	Moderadamente rápida	No pegajoso y no plástico	No pegajoso y no plástico
Retención de humedad:	Mala	Moderadamente rápida	Rápida
Presencia de raicillas:	Escasa	Mala	Mala
Presencia de macroorganismos:	Escasa	Escasa	No hay
Contenido de materia orgánica:	Bajo	Escasa	No hay
Reacción al HC1	No	Bajo	Muy bajo
		No	No

Observaciones:

Drenaje externo: lento;
 " interno: medio
 " natural: pobremente drenado
 Pendiente: 0 – 1%
 Relieve: plano
 Erosión: laminar

Profundidad efectiva: 0.40 mts
 Nivel freático: 8 a 9 metros en verano
 Apreciación textural: liviana

Uso actual: pastos naturales, mango, merey
 plátano

LOCALIZACION DE
PERFILES

CONVENCIONES


- Perfil ■
- Capital ●
- Corregimiento ●
- Fundaciones •
- Escala 1: 600.000

UNIVERSIDAD DE
BOGOTA

JORGE TADEO LOZANO

FACULTAD DE RECURSOS
NATURALES

DEPARTAMENTO DE AGROLOGIA
1.965



Perfil N° 3

Fecha: 3 de febrero de 1965

Localización: A 500 metros de San Rafael de Murillo por el carretable que conduce a Puerto Carreño.
Fundación "Puño de Oro"

Altura: 97 metros sobre el nivel del mar- Aprox.

Describieron: Joaquín Álvarez – Hernando Suárez

Textura:	0.0 – 0.30 Arenoso franco	0.30 – 0.40 Arenoso	0.40 – X Arenoso
Estructura:	Migajosa	Migajosa	
Color:	10 YR 5/2 marrón grisáceo	10 YR 7/6 amarillo	10 YR 7/8 amarillo (Con moteados de color 2.5 YR 3/6 rojo oscuro)
Consistencia en seco:	Suelta;	Suelta;	Suelta;
" en húmedo:	Friable;	Friable;	Friable;
" en mojado:	No pegajoso y no plástico	No pegajoso y no plástico	No pegajoso y no plástico
Permeabilidad:	Rápida	Rápida	Moderadamente lenta
Retención de humedad:	Mala	Media	Regular
Presencia de raicillas:	Abundante	Abundante	Escasa
Presencia de macroorganismos:	Abundante		Escasa
Contenido de materia orgánica:	Media	Baja	Muy baja
Reacción de HC1:	No	No	No

Observaciones:

Drenaje externo: rápido
" interno: rápido
" natural: bien drenado
Pendiente: 0 – 1%
Relieve: plano
Erosión: no hay

Profundidad efectiva: 0.50 mts
Nivel freático: 5 metros
Apreciación: textural: liviano

Uso actual: pastos naturales, algodón, mango, mery

Perfil N° 4

Fecha: 4 de febrero de 1965

Localización: A 2 kms de la Fundación "El Mery" en dirección al Río Meta

Altura: 95 metros sobre el nivel del mar- Aprox.

Describieron: Joaquín Álvarez – Hernando Suárez

Análisis Químico: 000351 (1)

Textura:	0.0 – 0.90 Arcillo limoso o arcilloso pesado.	Observaciones:
Estructura:	Subangular gruesa	Drenaje externo: Muy lento
Color:	2.5 YR 6/0 gris (Con moteados de color 4/8 rojo amarillento)	" interno: medio
Consistencia, en seco:	Muy duro;	" natural: muy pobremente drenado
" , en húmedo:	Friable;	Pendientes: 0 – 1%
" , en mojado:	No pegajoso y no plástico	Relieve: plano
Permeabilidad:	Rápida	Erosión: no hay
Retención de humedad:	Buena	Profundidad efectiva: 0.90 mts
Presencia de raicillas:	Abundante	Nivel freático: 7 metros
Presencia de macroorganismos:	Abundante	Apreciación: textural: liviano
Contenido de materia orgánica:	Muy bajo	Uso actual: pastos naturales, maíz, tomate, Patilla, pasto gramalote
Reacción al HC1:	No	Fase por inundación durante los meses de junio, Julio, agosto

Perfil N° 5

Fecha: 5 de febrero de 1965

Localización: A 2 kms de la Fundación "El Merey" en dirección E

Altura: 95 metros sobre el nivel del mar- Aprox.

Describieron: Joaquín Alvarez – Hernando Suárez

Textura:	0.0 – 0.90 Arenoso franco	0.10 – 0.40 Arenoso	0.40 – X Arenoso
Estructura:			
Color:	2.5 y 6/2 gris marrón	10 YR 7/4 marrón muy pálido	10 YR 6/6 amarillo marrón
Consistencia, en seco:	oscuro,	Suelta;	Suelta;
" , en húmedo:	Suelta;	Friable;	Friable;
" , en mojado:	Friable;	No pegajoso y no plástico	No pegajoso y no plástico
Permeabilidad:	No pegajoso y no plástico,	Muy rápida	Moderadamente rápida
Retención de humedad:	Muy rápida	Muy rápida	Moderadamente rápida
Presencia de raicillas:	Mala	Mala	Mala
Presencia de macroorganismos:	Regular	Escasa	Escasa
Contenido de materia orgánica:	Regular	Escasa	Escasa
Reacción al HC1:	Muy bajo	Muy bajo	Muy bajo
	No	No	No

Observaciones:

Drenaje externo: rápido
 " interno: rápido
 " natural: bien drenado
 Pendiente: 0 – 1%
 Relieve: plano

Erosión: laminar
 Profundidad efectiva: 0.50 mts
 Apreciación: textural: liviano

Uso actual: pastos naturales

Perfil N° 6

Fecha: 5 de febrero de 1965

Localización: A 1 kms de la Torre Geodésica

Altura: 96 metros sobre el nivel del mar-

Describieron: Joaquín Alvarez – Hernando Suárez

Textura:	0.0 – 0.50 Arenoso franco	0.50 – X Arenoso
Estructura:	Migajones blandos	
Color:	10 YR 3/1 grismuy oscuro,	7.5 YR 7/4 amarillo muy rojizo
Consistencia, en seco:	Suelta;	Suelta;
" , en húmedo:	Friable;	Friable;
" , en mojado:	No pegajoso y no plástico,	No pegajoso y no plástico
Permeabilidad:	rápida	Rápida
Retención de humedad:	Muy buena	Regular
Presencia de raicillas:	Abundante	No hay
Presencia de macroorganismos:	Abundante	No hay
Contenido de materia orgánica:	Alto	Muy bajo
Reacción al HC1:	No	No

Observaciones:

Drenaje externo: rápido
 " interno: rápido
 " natural: bien drenado
 Pendiente: 0 – 1%
 Relieve: plano

Erosión: no hay
 Profundidad efectiva: 0.60 mts
 Nivel freático: 4 metros aprox.
 Apreciación: textural: liviano
 Uso actual: pastos naturales



Foto N° 13 – Vista panorámica de la sabana.
Fundación “El Merrey”



Foto N° 14 – Perfil N° 3. Fundación “Puño de Oro”

Perfil N° 7

Fecha: 5 de febrero de 1965

Localización: A 1 kms del Río Bitá y a 20 kilómetros de su desembocadura en su margen izquierda. Fundación "La Pinzonera"

Altura: 97 metros sobre el nivel del mar- Aprox.

Describieron: Joaquín Álvarez – Hernando Suárez

Análisis Químico: 000353 (3)

Textura: Estructura: Color:	0.0 – 0.25 Arenoso franco Migajones blandos 7.5 YR 3/2 marrón oscuro.	0.25 – 0.50 Franco y arenoso Migajones blandos 10 YR 4/3 marrón a marrón oscuro (Con moteados de color 5 YR 4/8 rojo amarillento)	0.50 – X Arenoso 5 YR 6/1 gris claro a gris
Consistencia, en seco: " , en húmedo: " , en mojado:	Suelta; Friable; No pegajoso y no plástico,	Suelta; Friable; No pegajoso y no plástico	Suelta; Friable; No pegajoso y no plástico
Permeabilidad:	Rápida	Rápida	Rápida
Retención de humedad:	Buena – ver nivel freático	Buena	Muy buena
Presencia de raicillas:	Abundante	Escasa	No hay
Presencia de macroorganismos:		Escasa	No hay
Contenido de materia orgánica:	Alto	Medio	Muy bajo
Reacción al HC1:	No	No	No

Observaciones:

Drenaje externo: lento
 " interno: lento
 " natural: imperfectamente drenado
 Relieve: plano
 Pendiente: 0 – 1%
 Erosión: no hay
 Profundidad efectiva: 0.60 mts

Nivel freático: 0.65 metros
 Apreciación Textural: liviano
 Uso actual: bosques de galería con gran cantidad de madera de muy buena calidad
 Suelos sometidos periódicamente a condiciones de inmersión

Perfil N° 8

Fecha: 6 de febrero de 1965

Localización: A 35 kms de la desembocadura del Río Bitá por su margen derecha

Altura: 99 metros sobre el nivel del mar- Aprox.

Describieron: Joaquín Álvarez – Hernando Suárez

Textura: Estructura: Color:	0.00– 0.30 Limoso Subangular fina 7.5 YR 5/1 gris (Con moteados de color 7.5 YR 3/1 gris claro)	0.30 – 0.70 Franco Limoso 2.5 YR 4/1 gris oscuro	0.70 – X Arenoso 10 YR 5/2 marrón grisaseo
Consistencia, en seco: " , en húmedo: " , en mojado:	Blanda; Friable; No pegajoso y no plástico,	Suelta; Friable; No pegajoso y no plástico	Blanda; Friable; No pegajoso y no plástico
Permeabilidad:	Moderablemente rápida	Moderablemente rápida	Rápida
Retención de humedad:	Regular	Buena	Mala
Presencia de raicillas:	Abundante	Abundante	No hay
Presencia de macroorganismos:	Abundante	Abundante	No hay
Contenido de materia orgánica:	Bajo	Bajo	Muy bajo
Reacción al HC1:	No	No	No

Observaciones:

Drenaje externo: lento
 " interno: medio
 " natural: imperfectamente drenado
 Pendiente: 0 – 1%
 Relieve: plano

Erosión: no hay
 Profundidad efectiva: 0.70 mts
 Nivel freático: 8 a 9 metros en verano- aprox.
 Apreciación Textural: liviano
 Uso actual: pastos naturales

Perfil N° 9

Fecha: 8 de febrero de 1965

Localización: A 40 kms de la desembocadura del Río Bitá y a 3 kilómetros de su margen derecha. En la Sabana.

Altura: 99 metros sobre el nivel del mar- Aprox.

Describieron: Joaquín Álvarez – Hernando Suárez

Textura:	0.00– 0.50	0.50 – x
Estructura:	Arenoso franco	Arenoso
Color:	Migajones blandos	
Consistencia, en seco:	10 YR 3/1 gris muy oscuro.	7.5 YR 4/1 amarillo muy rojizo
" , en húmedo:	Suelta;	Suelta;
" , en mojado:	Friable;	Friable;
Permeabilidad:	No pegajoso y no plástico,	No pegajoso y no plástico
Retención de humedad:	Rápida	Rápida
Presencia de raicillas:	Regular	Regular
Presencia de macroorganismos:	No hay	No hay
Contenido de materia orgánica:	Abundante	No hay
Reacción al HCl:	Alto	Muy bajo
	No	No

Observaciones:

Drenaje externo: rápido
 " interno: rápido
 " natural: bien drenado
 Pendiente: 0 – 1%
 Relieve: plano

Erosión: no hay
 Profundidad efectiva: 0.60 mts
 Nivel freático: 4 metros - aprox.
 Apreciación Textural: muy liviano
 Uso actual: pastos naturales

Perfil N° 10

Fecha: 9 de febrero de 1965

Localización: A 15 kms de Puerto Carreño por el carretable que conduce a Puerto López. Fundación "Tres Matas"..

Altura: 95 metros sobre el nivel del mar- Aprox.

Describieron: Joaquín Alvarez – Hernando Suárez

Análisis Químico: 000352 (2)

Textura:	0.00– 0.20 Arenoso franco	0.20 – x Arenoso
Estructura:		
Color:	7.5 YR 4/4 marrón a marrón oscuro.	5 YR 6/8 amarillo rojizo
Consistencia, en seco:	Suelta;	Suelta;
" , en húmedo:	Friable;	Friable;
" , en mojado:	No pegajoso y no plástico,	No pegajoso y no plástico
Permeabilidad:	Rápida	Rápida
Retención de humedad:	Mala	Mala
Presencia de raicillas:	Escasa	No hay
Presencia de macroorganismos:	Escasa	No hay
Contenido de materia orgánica:	Bajo	Muy bajo
Reacción al HC1:	No	No

Observaciones:

Drenaje externo: rápido
 " interno: rápido
 " natural: bien drenado
 Pendiente: 0 – 1%
 Relieve: plano

Erosión: no hay
 Nivel freático: 6 metros - aprox.
 Uso actual: pastos naturales, plátano




Foto N° 15 – Perfil N° 4. "La Pinzonera", suelos aluviales que por sus condiciones especiales son los agriculturalmente más ricos y apreciados.



Foto N° 16 – Perfil N° 9. Vegas aluviales del Río Bitá.

Perfil N° 11

Fecha: 9 de febrero de 1965

Localización: A 3 kms de Puerto Carreño en dirección al Río Bitá. Fundación "La Cabaña"

Altura: 95 metros sobre el nivel del mar

Describieron: Joaquín Álvarez – Hernando Suárez

Análisis : 000355 (5)

Textura:	0.00– 0.15	0.15 – 0.30	0.30 – X
Estructura:	Franco arenoso	Franco arenoso	Arenoso
Color:	Migajones blandos y finos	Migajones blandos y finos	
Consistencia, en seco:	10 YR 6/2 marrón a marrón oscuro.	10 YR 5/6 amarillo rojizo	10 YR 6/3 marrón pálido(Con moteados de color 5 YR 5/8 rojo amarillento
" , en húmedo:	Suelta;	Suelta;	Suelta;
" , en mojado:	Friable;	Friable;	Friable;
Permeabilidad:	No pegajoso y no plástico,	No pegajoso y no plástico	No pegajoso y no plástico
Retención de humedad:	Rápida	Muy lenta	Muy lenta
Presencia de raicillas:	Regular	Buena	Muy buena
Presencia de macroorganismos:	Abundante	Abundante	No hay
Contenido de materia orgánica:	Abundante	Abundante	No hay
Reacción al HC1:	Alto	Media	Muy bajo
	No	No	No

Observaciones:

Drenaje externo: lento
 " interno: lento
 " natural: moderadamente bien drenado
 Pendiente: 0 – 1%
 Relieve: plano

Erosión: no hay
 Profundidad efectiva: 0.40 mts
 Nivel freático: 5 metros - aprox.
 Apreciación textural: muy liviano
 Uso actual: pastos naturales, plátano

Perfil N° 12

Fecha: 9 de febrero de 1965

Localización: A 3.5 kms de Puerto Carreño en dirección al Río Bitá. "La Cabaña".

Altura: 95 metros sobre el nivel del mar.

Describieron: Joaquín Álvarez – Hernando Suárez

	0.00– 0.25	0.25 – 0.35	0.35 – 1.20	1.20 - X
Textura:	Arenoso franco	Arenoso franco	Arenoso	
Estructura:	Migajosa débil	Migajones finos		
Color:	10 YR 6/3 marrón pálido	10 YR 8/6 amarillo rojizo	7.5 YR 7/6 amarillo rojizo	Capa de arrecife de color 10 YR 4/4 rojo oscuro, con moteados de color 7.5 YR 7/6 amarillo rojizo. El arrecife es blando.
Consistencia, en seco:	Suelta;	Suelta;	Suelta;	
Consistencia, en húmedo:	Friable;	Friable;	Suelta;	
Consistencia, en mojado:	No pegajoso y no plástico,	No pegajoso y no plástico	No pegajoso y no plástico	
Permeabilidad:	Rápida	Rápida	Muy rápida	
Retención de humedad:	Mala	Mala	Mala	
Presencia de raicillas:	Escasa	No hay	No hay	
Presencia de macroorganismos:	Escasa	No hay	No hay	
Contenido de materia orgánica:	Bajo	Muy bajo	Muy bajo	
Reacción al HCl:	No	No	No	

Observaciones:

Drenaje externo: lento
 " interno: lento
 " natural: moderadamente bien drenado
 Pendiente: 0 – 1%
 Relieve: plano

Erosión: no hay
 Profundidad efectiva: 0.80 mts
 Nivel freático: 3.50 metros
 Apreciación textural: muy liviano
 Uso actual: pastos naturales, plátano

Perfil N° 13

Fecha: 9 de febrero de 1965

Localización: A 5 kms de Puerto Carreño en dirección al Río Bitá.

Altura: 95 metros sobre el nivel del mar. Aprox.

Describieron: Joaquín Álvarez – Hernando Suárez

	0.00– 0.15	0.15 – 0.30	0.30 – X
Textura:	Franco arenoso	Franco arenoso	Arenoso
Estructura:	Migajones blandos y finos.	Migajones blandos y finos.	
Color:	10 YR 6/2 gris a marrón claro	10 YR 5/6 marrón grisaseo.	10 YR 6/3 marrón pálido (Con moteados de color 5 YR 5/8 rojo amarillento).
Consistencia, en seco:	Suelta;	Suelta;	Suelta;
Consistencia, en húmedo:	Friable;	Friable;	Blanda;
Consistencia, en mojado:	No pegajoso y no plástico,	No pegajoso y no plástico	No pegajoso y no plástico
Permeabilidad:	Rápida	Muy lenta	Muy lenta
Retención de humedad:	Regular	Buena	Muy buena
Presencia de raicillas:	Abundante	Abundante	No hay
Presencia de macroorganismos:	Abundante	Abundante	No hay
Contenido de materia orgánica:	Alto	Media	Muy bajo
Reacción al HC1:	No	No	No

Observaciones:

Drenaje externo: lento
 " interno: lento
 " natural: moderadamente bien drenado
 Pendiente: 0 – 1%
 Relieve: plano

Erosión: no hay
 Profundidad efectiva: 0.40 mts
 Apreciación textural: muy liviano
 Uso actual: pastos naturales, plátano
 La capa de arrecife se encuentra a 0.60 metros de Profundidad.

Perfil N° 14

Fecha: 11 de febrero de 1965

Localización: A 17 kms de Puerto Carreño en dirección al Río Orinoco y a 3 kilómetros del mismo.

Altura: 96 metros sobre el nivel del mar.

Describieron: Joaquín Álvarez – Hernando Suárez

	0.00– 0.15	0.15 – 0.25	0.25 – X
Textura:	Arenoso franco	Arenoso	Arenoso
Estructura:			
Color:	10 YR 6/1 gris claro	10 YR 7/3 marrón muy pálido.	10 YR 8/8 amarillo
Consistencia, en seco:	Suelta;	Suelta;	Suelta;
Consistencia, en húmedo:	Friable;	Friable;	friable;
Consistencia, en mojado:	No pegajoso y no plástico, Rápida	No pegajoso y no plástico Muy rápida	Ligeramente pegajoso y ligeramente plástico Rápida
Permeabilidad:			
Retención de humedad:	Mala	Mala	Regular
Presencia de raicillas:	Escasa	Escasa	No hay
Presencia de macroorganismos:	Escasa	Abundante	
Contenido de materia orgánica:	Muy bajo	Muy bajo	Muy bajo
Reacción al HC1:	No	No	No

Observaciones:

Drenaje externo: rápido
 " interno: rápido
 " natural: bien drenado
 Pendiente: 0 – 1%
 Relieve: plano

Erosión: no hay
 Profundidad efectiva: 0.50 mts
 Nivel freático: -----
 Apreciación textural: muy liviano
 Uso actual: pastos naturales.

Perfil N° 15

Fecha: 11 de febrero de 1965

Localización: Aproximadamente a 30 kms de Puerto por la margen izquierda del Río Orinoco y a 4 klm del mismo.
Fundación "Ventanas"

Altura: 96 metros sobre el nivel del mar. Aprox.

Describieron: Joaquín Álvarez – Hernando Suárez

Textura: Estructura: Color: Consistencia, en seco: " , en húmedo: " , en mojado: Permeabilidad: Retención de humedad: Presencia de raicillas: Presencia de macroorganismos: Contenido de materia orgánica: Reacción al HC1:	0.30– 0.60 Arenoso franco Migajones blandos 10 YR 6/3 marrón pálido Ligeramente dura. Muy friable; No pegajoso y no plástico. Muy rápida Mala Abundante Abundante Baja. No	0.60- X Arenoso 10 YR 7/6 amarillo Suelta; Friable; No pegajoso y no plástico. Moderablemente rápida Buena Escasa Escasa Muy bajo No
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Observaciones:

Drenaje externo: lento
" interno: lento
" natural: moderadamente bien drenado
Pendiente: 0 – 1%
Relieve: plano

Erosión: no hay
Profundidad efectiva: 0.80 mts
Nivel freático: Aprox. 4 metros
Apreciación textural: muy liviano
Uso actual: pastos naturales, plátano, yuca, maíz

Perfil N° 16

Fecha: 11 de febrero de 1965

Localización: Aproximadamente a 30 kms de Puerto por la margen izquierda del Río Orinoco y a 20 klm del mismo.
Fundación "Ventanas"

Altura: 97 metros sobre el nivel del mar. Aprox.

Describieron: Joaquín Álvarez – Hernando Suárez

	0.00– 0.30	0.30 – 0.40	0.40 – 0.50	0.50 - X
Textura:	Arenoso franco	Arenoso franco	Arenoso	Arenoso
Estructura:				No
Color:	10 YR 5/1 gris	10 YR 6/2 gris marrón claro	10 YR 7/4 marrón muy pálido	10 YR 6/6 amarillo marrón.
Consistencia, en seco:	Suelta;	Suelta;	Suelta;	Blanda
Consistencia, en húmedo:	Friable;	Friable;	Friable;	Friable.
Consistencia, en mojado:	No pegajoso y no plástico,	No pegajoso y no plástico	No pegajoso y no plástico	No pegajoso, no
Permeabilidad:	Rápida.	Rápida.	Muy rápida	plástico.
Retención de humedad:	Mala.	Mala.	Rápida.	Rápida.
Presencia de raicillas:	Abundante.	Regular.	Mala.	Mala.
Presencia de macroorganismos:	Escasa.	Regular.	Regular.	No hay.
Contenido de materia orgánica:	Muy bajo.	No hay.	No hay.	No hay.
Reacción al HCl:	No	Muy bajo.	No hay.	No hay.
	No	No	Muy bajo.	No hay.
		No	No	No

Observaciones:

Drenaje externo: rápido
" interno: rápido
" natural: bien drenado
Pendiente: 0 – 1%
Relieve: plano

Erosión: laminar
Profundidad efectiva: 0.50 mts
Nivel freático: 7 a 8 metros
Apreciación textural: muy liviano
Uso actual: pastos naturales.

Perfil N° 17

Fecha: 12 de febrero de 1965

Localización: Según el mapa adjunto

Altura: 94 metros sobre el nivel del mar. Aprox.

Describieron: Joaquín Álvarez – Hernando Suárez

	0.00– 0.30	0.30 – 0.45	0.45 – 0.65	0.65 - X
Textura:	Arenoso franco	Arenoso franco	Arenoso	Arenoso
Estructura:				
Color:	10 YR 5/2 marrón oscuro	10 YR 5/3 marrón	10 YR 5/4 marrón amarillento.	5 YR 5/8 amarillento.
Consistencia, en seco:	Suelta.	Suelta.	Suelta.	Blanda
Consistencia, en húmedo:	Suelta.	Friable.	Friable;	Friable.
Consistencia, en mojado:	No pegajoso y no plástico, Rápida.	No pegajoso y no plástico Rápida.	No pegajoso y no plástico Muy rápida Muy Rápida.	Ligeramente pegajoso y ligeramente plástico. Lenta..
Permeabilidad: Retención humedad:	Mala.	Mala.	Mala.	Regular.
Presencia de raicillas:	Regular.	No hay.	Escasa.	No hay.
Presencia de macroorganismos:	regular.	No hay.	Escasa.	No hay.
Contenido de materia orgánica:	Bajo.	Bajo.	Bajo.	Muy bajo.
Reacción al HC1:	No	No	No	No

Observaciones:

Drenaje externo: lento
 " interno: lento
 " natural: imperfectamente drenado
 Pendiente: 0 – 1%
 Relieve: plano

Erosión: laminar
 Profundidad efectiva: 0.50 mts
 Nivel freático:
 Apreciación textural: muy liviano
 Uso actual: pastos naturales.

Perfil N° 18

Fecha: 13 de febrero de 1965

Localización: A 10 kms de Causarito y a 10 kms de la margen derecha del Río Orinoco. Fundación "Tanumana"

Altura: 95 metros sobre el nivel del mar. Aprox.

Describieron: Joaquín Álvarez – Hernando Suárez

Análisis : 000354 (4)

Textura:	0.00– 0.15 Franco arenoso	0.15 – 0.35 Arenoso franco	0.35 – X Arenoso
Estructura:	Migajones blandos y finos		
Color:	10 YR 5/3 marrón	10 YR 6/6 amarillo marrón	7.5 YR marrón oscuro oscuro
Consistencia, en seco:	Suelta;	Suelta;	Suelta;
" , en húmedo:	Friable;	Friable;	Friable;
" , en mojado:	No pegajoso y no plástico,	No pegajoso y no plástico	No pegajoso y no plástico
Permeabilidad:	Rápida	Rápida	Muy rápida
Retención de humedad:	Mala	Mala	Buena
Presencia de raicillas:	Abundante	Regular	No hay
Presencia de macroorganismos:	Abundante	Regular	No hay
Contenido de materia orgánica:	Bajo	Bajo	Muy bajo
Reacción al HCl:	No	No	No

Observaciones:

Drenaje externo: rápido
 " interno: rápido
 " natural: bien drenado
 Pendiente: 0 – 1%
 Relieve: plano

Profundidad efectiva: 0.40 mts
 Apreciación textural: muy liviano
 Uso actual: pastos naturales

Sabana cuya característica principal es presentar el afloramiento del arrecife. Erosión: laminar



Foto N° 17 – Perfil N° 12. Suelo típico de la terraza alta. Fundación "La Cabaña".



Foto N° 18 – Vista panorámica de la sabana que representa el perfil N° 17.

ANÁLISIS QUÍMICOS DE LOS GASES
RESULTADO DE LOS ANÁLISIS QUÍMICOS
 Laboratorio Químico Nacional

Muestra N°.....	000351 (1)	000352 (2)	000353 (3)	000354 (4)	000355 (5)
Referencia.....	"El Mery"	"Tres Matas"	"La Pinzonera"	"Tanumana" P-X	"La Cabaña"
PH, acidez.....	P-10-1 4.43	P-9-1 4.78	P-15-8 4.63	5.05	P-12-4 4.30
Fósforo Hellige, lentamente asimilable, P Kg/Ha	15 muy pobre	10 muy pobre	5.0 muy pobre	2.5 muy pobre	10 muy pobre
Potasio asimilable , K Kg/Ha.....	180 regular	100 pobre	100 pobre	160 regular	80 pobre
Calcio, Ca Kg/Ha..	500 muy pobre	800 pobre	300 muy pobre	500 muy pobre	300 muy pobre
Nitratos, N Kg/Ha..	15 pobre	20 pobre-regular	15 pobre	30 regular	20 pobre-regular
Amonio, N Kg/Ha..	30 regular	25 regular	20 pobre-regular	40 rico	10 pobre
Resistencia eléctrica, ohms....	3.700	15.000	12.000	3.500	12.000
Clase de suelo (Salinidad).....	0 (no afectado)	0 (no afectado)	0 (no afectado)	0 (no afectado)	0 (no afectado)
Textura de tacto....	Arcillo limoso o Arcillosos pesado	Arenoso franco	Arenoso franco	Franco arenoso	Franco arenoso
Materia orgánica (apreciada)	Pobre	Pobre	Regular	Regular	Pobre

Observaciones y Recomendaciones. En términos generales, los suelos en referencia se encuentran en muy pobres condiciones de nutrientes y son muy ácidos. Un uso racional, de acuerdo a las condiciones físicas de tales suelos, sería destinar el suelo N°1 para arroz, maíz y caña. Los suelos 3 y 4 para ciertos cultivos de terrenos sueltos como algodón, yuca, plátano, etc. Para los suelos 2 y 5 se insinúan los pastos, debido a su baja cantidad de materia orgánica. Se recomienda la aplicación de escorias Thomas o de roca fosfórica, que sería un modo de subir la acidez y mejorar el contenido de fósforo en forma económica; las escorias Thomas pueden usarse a razón de media a una tonelada por hectárea según la textura. Igualmente se necesitan abonos nitrogenados (mayor cantidad requieren los suelos 2,2 y 5) y abonos potásicos (mayores cantidades para los suelos 2,3 y 5). No se dan recomendaciones específicas para determinar cultivos porque no se solicitan. Procurar una mejora del contenido de materia orgánica y de efectuar rotaciones con pastos, leguminosas, etc. Se recomienda además efectuar análisis periódicos de control de materia orgánica, acidez y elementos nutritivos, en procura de buenos resultados en las cosechas.

Laboratorio Químico Nacional, Sección Química Agrícola.
 (Fdo) Jorge Vives Abello*

* El profesor Dr. Jorge Vives Abello es catedrático titular de la Facultad de recursos Naturales es la Universidad de Bogotá "Jorge Tadeo Lozano"

FERTILIZANTES

REQUERIMIENTO, EXISTENCIA Y APORTE DE FERTILIZANTES PARA LOS DIFERENTES CULTIVOS

	Algodón			Plátano			Arroz			Maíz			Cacao			Piña		
	N	P	K	N	P	K	N	P	K	N	P	K	N	P	K	N	P	K
Requerimientos.....	84	34	87	63	16	207	65	20	75	128	48	140	14	7	11	130	40	240
Existencia muestra																4		
000351 (1)	45	15	180	45	15	180	45	15	180	45	15	180	45	15	180	5	15	180
Aportes necesarios	244	126	0	112	7	45	125	33	0	518	220	0	0	0	0	500	166	100
Existencia muestra																		
000352 (2)....	45	10	100	45	10	100	10	100	45	45	10	100	45	10	100	45	10	100
Aportes necesarios...	244	160	0	112	40	180	125	66	0	518	253	66	0	0	0	500	200	230
Existencia Muestra																		
000353 (3)...	35	5	100	5	100	35	5	100	35	5	100	35	5	100	35	5	100	
Aportes necesarios..	306	193	0	175	73	180	187	0	581	287	0	14	0	14	0	594	233	230
Existencia muestra																		
000355 (5).....	70	25	160	70	25	160	70	25	160	75	25	160	70	25	160	70	25	160
Aportes necesarios..	88	60	0	0	0	78	0	0	0	352	153	0	0	0	0	375	100	135
Existencia muestra																		
000354 (4)	30	10	80	30	10	80	30	10	80	30	10	80	30	10	80	30	10	80
Aportes necesarios..	377	160	12	206	40	211	218	66	0	612	253	100	0	0	0	625	200	266

Fórmulas calculadas en base de los siguientes compuestos:

Nitrato Sódico 16%
Escorias 15%
CIK 60%

CAPITULO XI

ZONA GEO-ECONOMICA

Aunque el presente estudio se limitó al triángulo Puerto Carreño-Casuarito-San Rafael de Murillo, la zona menos fértil de la Comisaría, las observaciones objetivas abarcaron casi todo el territorio del Vichada. Este hecho nos autoriza para tratar los aspectos y condiciones reales de una extensa región, que por sus características altamente favorables, es justo considerada como una zona geoeconómica de incalculables posibilidades en el campo agropecuario.

Toda la margen del Río Meta y la propia del Río Bitá, que corren paralelos a una distancia promedio de 15 kilómetros brindan amplias y fáciles perspectivas para su explotación inmediata. En ella figuran en primer término las jurisdicciones de Avispas y Nueva Antioquia. Avispas, por ejemplo, tiene solo dos años de fundada y cuenta con una población mayor de 1.000 habitantes siendo la mayor parte civilizados; tiene un censo ganadero de 45.000 cabezas, lo cual confirma la calidad de estas tierras en el renglón agropecuario.

En los dos últimos años se ha venido presentando una inmigración progresiva de habitantes y ganados procedentes del departamento del Meta. Boyacá y la intendencia de Arauca. Son gentes ávidas de un mejor nivel de vida, que las circunstancias los mantienen unidos. Tal hecho ha creado entre ellos una comunidad de intereses e ideales, pudiéndose afirmar que practican la acción comunal, por medio de la cual mantienen el orden e higiénico de las zonas urbanas: han construido sus campos de aterrizaje. Han realizado la arborización de calles y proyectan otros servicios como es la construcción de carretables, centros de salud, escuelas, alcantarillados y alumbrado eléctrico con la ayuda del Estado.

Esta zona geo-económica cuenta en la actualidad con un deficiente servicio de transporte fluvial circunstancia que mantiene la unidad de la región. Por medía de este servicio tienen entrada y salida los diversos productos, que desde luego escapan a lodo impuesto.

Por el Río Meta bajan productos tales como papa, verduras, hortalizas, licores, cervezas, cigarrillos, telas, cemento, etc .. que se van vendiendo a lo largo del río tanto a colombianos como a venezolanos.

Con frecuencia ocurre que los transportes llegan vacíos a Puerto Carreño, ocasionando la escasez de víveres.

El Río Meta ha facilitado la colonización espontánea. Los colonos se encuentran aislados y pocas veces en pequeñas concentraciones.

La falta de capital y la carencia de vías de comunicación son la causa principal para el estancamiento de la zona o su limitado progreso.

Muchas son las capitánías indígenas que se encuentran en esta zona: en solo Avispas hay seis con una población infantil mayor de 100 para cada una. Su estado de civilización es mediano.

En la jurisdicción de Avispas sería necesaria la instalación de por lo menos cuatro escuelas para atender la población indígena en edad escolar.

El plan de colonización que se proyecta para esta región, incorporará en poco tiempo todo el elemento humano civilizado e indígena que como se dijo en otra parte, es mayor de 30.000 para toda la Comisaría.

Actualmente la inspección de Avispas recauda \$ 10.000.00 al año, pero está en capacidad de elevar dicha cifra a \$ 100.000.00 al año solo por concepto de impuesto al ganado que sale, si dispusiera de un control más eficaz.

CAPITULO XII
COLONIZACION

**PROYECTO DE COLONIZACION DE LA FAJA ENMARCADA POR LOS RIOS META,
ORINOCO, BITA Y EL BAJO DE "LA CULEBRA"**

No solo esta zona, sino todo el Vichada, puede ser el asiento de una gran familia, de una sociedad que hoy deambula sin rumbo por ciudades, completamente indeseada sin suplir al menos las más urgentes necesidades vitales. La aglomeración de grandes masas humanas en las ciudades, está creando problemas de carácter social, que de novedades pronta solución tendrían un desenlace de características imprevisibles. No se debe permitir que estos problemas del desarrollo tomen perfiles dramáticos; hay mucha gente que busca afanosamente la oportunidad de trabajar para lograr su mejoramiento, social y económico.

Para ver las características del problema con todas sus probables secuelas, imaginémosnos solamente que el país tendrá dentro de escasos veinte años una población aproximada de 32.000.000 de habitantes, a los cuales se tendrá que proveer de alimentos, techo, educación y todas las garantías tanto materiales como espirituales que les permitan desarrollar una vida digna. Esto no deja de hacer cavilar la mente más optimista en busca de soluciones que persigan el bienestar de toda la comunidad colombiana.

Es por estas circunstancias que dejamos consignadas las inquietudes de los colonos, quienes desean que sigan llegando compatriotas para explotar la riqueza de estas regiones abandonadas y les llegue el crédito, la maquinaria, la técnica, etc. y permita que estas zonas se integren debidamente a la economía del país.

Algunos colonos establecidos en la zona de estudio y márgenes de los ríos Bitá, Meta, el "Bajo de La Culebra" y zonas aledañas, expusieron algunas ideas que deben tenerse en cuenta para futuros planes de colonización de esas inmensas llanuras. Es interesante ver la buena voluntad, y a veces, el entusiasmo con que los colonos espontáneos desean que esos territorios sean parte integrante de la economía del país. Esta es una zona a la cual el gobierno no le ha puesto lo más mínimo interés dejando que sus problemas se resuelvan por sí solos.

La colonización debidamente planeada que pretenden estos entusiastas colonos ha sido concebida, calculada y organizada desde hace mucho tiempo, y está basada en la experiencia que durante varios años han logrado en la continua brecha contra la no pocas veces cruel naturaleza.

Además de sus conocimientos elementales sobre cooperativismo, han tenido iniciativas tan laudables como ser los fundadores, entre otras cosas de la Cooperativa "Cosurco", establecidas en las cabeceras de los ríos Tomo, Tuparro y Muko.

Es bueno advertir que ni el gobierno ni sus instituciones especializadas como el Incora, han participado en ningún tipo o plan de colonización; los colonos que lo han hecho hasta la fecha, ha sido espontáneamente, enfrentándose, por razones obvias, a dificultades sin límite. Les ha faltado el crédito, la asistencia técnica, vías de penetración, centros de distribución y consumo de productos, etc. A pesar de esto, algunos han logrado superar todas estas dificultades y han salido avantes en los objetivos que se han propuesto, todo lo cual es un ejemplo digno de ser estudiado para establecer en la misma forma centros de colonización con todos los servicios y garantías que estas empresas demandan. Como ejemplo de ser imitado tenemos el caso de Venezuela, en donde le han dado una especial importancia a los planes de colonización a través del Instituto Agrario Nacional puesto bajo la experta dirección del Dr. Wenceslao Mantilla antiguo profesor de nuestra Universidad.

Condiciones actuales de la zona. La faja tiene una longitud aproximada de 300 kilómetros y una anchura de 15 kilómetros y encierra una extensión aproximada de 450.000 hectáreas.

En su bosque de galería hay grandes existencias de madera fina, que bien merecería un estudio dasanómico para asegurar su racional explotación. Entre las especies que abundan merecen destacarse las siguientes:

Asasafrás o sarsafrás, cedro, comino real, laurel comino, saladito, verraco, caramatale o corazón, acato, etc,

En el orden de las palmas existen, entre otras:

Palma real, palma de moriche, palma de cumare, palma de ataco, palma macaná, etc., las cuales se emplean para la construcción de lechos, la hechura de hamacas o chinchorros y además son una fuente de alimentación de los cerdos.

Se encuentra además el pendare o chicle del Orinoco, y gran variedad de maderas que pueden ser inmensa fuente de riqueza en la elaboración de papel, celulosa, plásticos, trípex, etc.

En principio podría establecerse una ganadería de tipo extensivo en las sabanas y una agricultura de subsistencia en las vegas, vegones, e islas aluviales, cuya área aproximada es de 100.000 hectáreas, las cuales ofrecen especiales condiciones para la agricultura. En estas islas y vegas, actualmente cultivan con magnífico rendimiento: algodón, ajonjolí, soya, arroz, maíz, frijol, yuca y plátano.

*Los Pastos Naturales y Foráneos.*_ En cuanto a gramíneas y leguminosas nativas se tomaron muestras representativas de la región para su identificación posterior.

Se observó en una fundación de un colono en las proximidades de Casuarito, la presencia del pasto Yaragua Uribe o Faragua (*Hypharrenia rufa* Nees) stopf.. frondoso pese a la sequía reinante. Esto nos hace pensar que se podrían introducir las gramíneas y leguminosas siguientes:

Pasto Rhodes, Pasto Argentina, Pasto Pangola, Pasto Amor, Pasto Dollis, Pasto Bahía, Pasto Negro, Pasto Elefante, Pasto Sorgo Almun, Pasto Sudán, Sorgo Forrajero, Guandul, Rabo de Iguana, Bejuco de Chieve, Amor Seco, Kudzú Tropical, Frijol Terciopelo, Caupi y Cargadita, etc.

UN MOSHAV COLONIA AGRICOLA DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS

Posible Método a Seguir.- En principio se establecerían 200 familias convenientemente distribuidas. Se habilitaría un equipo móvil para la construcción de las respectivas viviendas y se utilizarían para tal fin, exclusivamente, el material de la región como son las maderas y las palmas. Para que estos nuevos colonos puedan desarrollar normalmente sus capacidades físicas y mentales, se les proporcionará un centro de actividades que influya política y administrativamente en toda la zona. Esta ciudadela se localizaría en un sitio equidistante que bien podría ser el sitio de "La Venturosa", o "Avispas" y constaría de servicios tales como los que presta una cooperativa, una escuela, un hospital. etc.

La inversión para cada familia podría distribuirse en la siguiente forma:

<i>Cantidad</i>	<i>Precio por Unidad</i>	<i>Costo Total</i>
50 novillas	\$ 300.00	\$ 15.000.00
3 toros		5.000.00
3 yeguas y 1 caballo		5.000.00
1 burro y 2 asnos		500.00
Herramientas por		1.000.00
Total para cada familia		26.500.00
Total para 200 familias		5'000.000.00
Costo de la ciudadela (cooperativa, hospital, escuela, aprox.)		100.000.00
GRAN TOTAL DE LA INVERSION		5'400.000.00

Al cabo de cinco años tendría quintuplicada y valorizada la ganadería en la siguiente forma: -cada familia tendría los siguientes haberes-

265 cabezas de ganado con un precio c/u. de \$ 800.00 \$212.000.00
 200 familias c/u. con \$ 212.000 representados en ganado \$ 42.000.000.00
 Existirían en total 53.000 cabezas de ganado.

El interés del dinero prestado durante 5 años, daría un monto de:

$$I = \frac{5'400.000.00 \times 8 \times 5}{100}$$

$$= 2'160.000.00$$

$$2'160.000.00 + 5'400.000.00 = 7'560.000.00$$



Foto N° 19 - La sabana presenta condiciones especiales para incrementar la ganadería, se observaron ejemplares de buena calidad como los que presenta la presente fotografía tomada en la Fundación "El Merey".

Foto N° 20 - En el bosque de galería encuentran muchas variedades de maderas finas y de regular calidad. De estas últimas variedades se podrían lograr industrias que produzcan triplex, papel, celulosa, etc.



No se incluyen ni se ha unido en cuenta el costo de la producción que darían las cosechas, la caballeriza, que a pesar de ser de subsistencia y empleo, indudablemente daría remanentes para otras inversiones.

Del producido durante los cinco años restamos el préstamo hecho y tendremos:

$$42'000.000.00 - 7.560.000.00 = 36'440.000.00$$

Estas cifras nos demuestran claramente la bondad de una inversión de esta naturaleza. Todas las cifras se ajustan a la realidad y a la experiencia de las personas promotoras de un proyecto de estas características.

La zona en mención tiene un carreteable que la comunica con Villavicencio el cual se sometería a un arreglo para que no haya demoras y sea expedito el intercambio comercial con el interior del país. El transporte aéreo muy de vez en cuando presta servicios a "La Venturosa" y "Avispas", pero existe la posibilidad de regularizados y ampliarlos, no solo a esta fundación sino a toda la zona por la facilidad que existe para la construcción de aeropuertos. Entre los patrióticos programas de "SATENA", que comunica 70 sitios de los Territorios Nacionales, hay uno para aumentar los aeropuertos de la Comisaría del Vichada.

CAPITULO XIII

CONCLUSIONES

De la observación general de la Comisaría y del estudio directo y objetivo del triángulo Casuarito-Puerto Carreño-San Rafael de Murillo, se desprenden las siguientes conclusiones:

- 1) Todo el territorio de la Comisaría es baldío, las pocas fundaciones carecen de título de propiedad; son extensas zonas potencialmente aptas para la explotación con ganadería extensiva.
- 2) Los ríos constituyen las vías de comunicación, principalmente en el invierno; el transporte motorizado es posible principalmente en la época de verano. El carretable Puerto Carreño-Puerto López puede utilizarse durante la época de verano sin Interrupción.
- 3) Las condiciones ecológicas y sanitarias son estimulantes para establecer extensas ganaderías para la explotación de carnes con fines a la exportación, principalmente a Venezuela y por la vía Orinoco a Europa.
- 4) En las riberas de los ríos que tienen su origen en la Cordillera Oriental se encuentran suelos aluviales aptos para la agricultura de subsistencia: así mismo, en las riberas de los ríos que tienen su origen en la misma llanura se encuentran suelos con buen contenido humedad, aptos para el cultivo de pastos y leguminosas. Los ríos de la llanura tienen su cauce bien formado, de difícil desbordamiento, pero presentan muchos meandros lo cual retarda la navegación.
- 5) El mayor ingreso de la zona estudiada lo proporcionan las actividades agropecuarias y comerciales.
- 6) El transporte de ganado entre el área de producción y Orocué-Puerto López, se hace por el Río Meta en planchones accionados por motores Diesel.
- 7) La zona estudiada es la menos fértil de todo el territorio del Vichada y su explotación ganadera se ve dificultada por la dificultad para establecer potreros artificiales debido a la textura arenosa de los suelos; pero en cambio es apta para el cultivo de frutales como el mango, marañón, patilla, guanábana, tomate, etc,
- 8) Existen en los márgenes de los ríos, principalmente la del Río Meta, pequeños núcleos ganaderos que bien pueden ser centros de avanzada para iniciar los programas de explotación agropecuaria. Estos centros están situados en Puerto Carreño, Tres Matas, San Rafael, El Porvenir, Puerto Murillo, La Venturosa, Parrure, Nueva Antioquia, Tierra Macha. San Jorge y Avispas.
- 9) La riqueza ictiológica que guardan los Ríos Orinoco. Meta y Bitá, es inmensa.

- 10) La población indígena vive en las más lamentables condiciones de miseria y abandono. Hay manifestaciones de inconformidad de parte de los indígenas, la cual se refleja en los ya regulares y continuos ataques a que se ven sometidos los colonos.
- 11) Por otra parte el elemento indígena es explotado.

CAPITULO XIV

RECOMENDACIONES

- 1) Usando material de relleno puede adaptarse fácilmente carretable Puerto Carreño-Puerto López para ser usado en todo tiempo hasta el bajo de "La Culebra", en una distancia aproximada de 450 kilómetros.
- 2) El proyecto de empalmar el carretable anterior con Santa Rita facilitaría enormemente el desarrollo del centro de la Comisaría.
- 3) Es urgente abrir frentes de trabajo en el sector agropecuario y obras públicas, a fin de mejorar las condiciones de vida y hacer más estimulante la inmigración. La zona estudiada debe destinarse para el cultivo de frutales, especialmente mangos y marañón o merey. La ribera del Orinoco que abarca el presente estudio ofrece especiales condiciones para el cultivo de sarrapio, cuya producción la compra Venezuela aun cuando este comercio tiende a desaparecer debido a la producción sintética de las esencias que de él obtienen. Actualmente un kilo vale cinco bolívares.
- 4) La instalación de una enlatadora será pronto urgente para el aprovechamiento y comercialización del mango y marañón, que son de excelente calidad.
- 5) La zona quedará bien intercomunicada cuando se adapte el carretable que va a Puerto López y se realice el proyecto de empalme entre este carretable y Santa Rita, cuando haya un servicio regular de transporte fluvial en los ríos Orinoco, Meta y Bitá.
- 6) Es necesario empezar la construcción y mantenimiento de los carretables e incrementar la navegación aérea y fluvial.
- 7) En los ríos Orinoco. - Jeta y Bitá hay una considerable riqueza ictiológica y su explotación no se ajusta a los principios conservacionistas. Es urgente hacer un estudio especializado de ella, estableciendo las épocas de veda para las diferentes especies para su adecuada explotación. Así mismo deben controlarse los bosques que constituyen refugio y fuente de alimentación para la fauna acuática.
- 8) Se recomienda el establecimiento de sucursales de la Caja Agraria en Avispas, Guacamayas. Cuma ribo, Casuarito y el aumento de la cartera para la sucursal de Puerto Carreño.
- 9) El Incora, el Banco Ganadero, Caminos Vecinales y demás entidades similares, deben incorporarse a esta zona para establecer programas de desarrollo a través de créditos supervisados, cooperativas, e incremento de la colonización.

- 10) Las misiones católicas no están haciendo nada positivo en beneficio de la población indígena, y es por lo tanto indispensable que la División de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, planifique y establezca programas adecuados para la redención de este valioso elemento, como lo está haciendo Venezuela con las concentraciones indígenas debidamente equipadas con talleres de aserrío, carpintería, escuelas vocacionales, etc., donde un cuerpo especializado de profesores imparten la enseñanza.
- 11) La Integración Fronteriza entre Colombia y Venezuela debe extenderse a esta zona para beneficio de ambas comunidades con idénticos problemas. Actualmente los planes de la Integración no cobijan esta zona.
- 12) Los comisarios para los territorios deben ser profesionales en alguna de las ramas agropecuarias y estar asesorados por un buen equipo de técnicos en la explotación de los diferentes recursos naturales, pues no es suficiente la buena voluntad y patriotismo, sino también su capacidad técnica y administrativa para que no se frene y retarde el desarrollo de la Comisaría.
- 13) Por la incapacidad administrativa y técnica los presupuestos que han tenido estos territorios no se traducen en realidades; sumados todos ellos para la realización de una obra específica, como por ejemplo una colonización, bien distinto sería el desarrollo que disfrutarían hoy estas zonas.

BIBLIOGRAFIA

- ALVAREZ LIEVANO, JOAQUIN - SUAREZ FAJARDO, HERNANDO.** Estudio de Suelos de "El Laberinto". Municipio de San Jacinto, Departamento de Bolívar. Bogotá, D. E., 1964
- BANCO DE LA REPUBLICA.** Atlas de la Economía Colombiana. Tercera Entrega. Fuente de Energía, Recursos Mineros y Forestales, Sistema de Comunicaciones. 1962. Imprenta del Banco de la República. (Nombres Científicos).
- BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (B.I D).** Estudio de Integración Fronteriza. Atlas Climatológico. Ministerio de la Defensa. Caracas. Pág. 184. Washington.
- BONAZZI, AUGUSTO.** Estudios Palinológicos Preliminares sobre el Arrecife del Alto Llano de Calabozo. Acta Científica Venezolana. Vol. 13 Págs. 53-58. 1962.
- CROWDER, LOY V.** Gramíneas y Leguminosas Forrajeras en Colombia. Centro Nacional de Investigaciones Agrícolas, Boletín Técnico N° 8, 1960.
- ESPINAL T., LUIS SIGIFREDO - Montenegro M., EDMO.** Formaciones Vegetales de Colombia. Instituto Geográfico de Colombia "Agustín Codazzi". Departamento Agrológico. Bogotá, D. E. 1963. Pág. 52.
- SOIL SURVEY - CLASSIFICATION AND CORRELATION, "7th APROXIMATION".** United States Department of Agriculture. Soil Conservation Service. Washington S, D.C. 20250. CHARLES E. KELLOG.
- MOLANO CAMPUZANO, JOAQUIN.** La Orinoquía Colombiana. Conferencias de Introducción al Estudio de los Recursos Naturales de Colombia. Facultad de Recursos Naturales, Universidad de Bogotá. Facultad de Recursos Naturales, Universidad de Bogotá "Jorge Tadeo Lozano". (Manuscrito) Bogotá, 1964.
- MOLANO CAMPUZANO, JOAQUIN.** De la Amazonía al Desierto de Abraham. Impresiones de un viaje

científico a Israel, (Folleto) Separata de la "Revista de las Fuerzas Armadas", Bogotá, 1964.

PEREZ ARBELAEZ, ENRIQUE. Plantas útiles de Colombia. Sucesores de Rivadeneyra (S.A) (Nombres Científicos).

ROBINSON WOODING, GILBERT. Los Suelos. Su origen, constitución y clasificación. Introducción a la Edafología. Ediciones Omega, S.A. Barcelona. Págs. 383, 384, 386. Edición 1960.

